# Индовазин




## Код АТХ:

- M02AA23

## Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- Индометацин
- Троксерутин

## Полезные ссылки:

Цена в Яндексе Горздрав Столички Апрель
Госреестр[МНН] [МНН] Википедия[МНН] [МНН] Реестр ЕАЭС
РЛС VIDAL Mail.Ru Drugs.com[англ]

## Форма выпуска:

◊ ***Гель для наружного применения*** от желтого до желто-коричневого цвета, с легкой опалесценцией.

| | **1 г** |
|---|---|
| индометацин | 30 мг |
| троксерутин | 20 мг |

*Вспомогательные вещества:* карбомер - 23 мг, макрогол 400 - 524.5 мг, натрия бензоат - 2.5 мг, пропиленгликоль - 100 мг, этанол 96% - 300 мг.

45 г - тубы алюминиевые (1) - пачки картонные.

## Фармакотерапевтическая группа:

- Ненаркотические анальгетики, включая нестероидные и другие противовоспалительные средства

## Фармакологические свойства:

***Фармакодинамика***

Индовазин гель представляет собой комбинированный лекарственный препарат, в состав которого входят индометацин и троксерутин.

*Индометацин* обладает выраженным противовоспалительным, анальгезирующим и противоотечным действием. Это приводит к снятию боли, уменьшению отека и сокращению времени восстановления поврежденных тканей. Основной механизм действия связан с подавлением синтеза простагландинов посредством обратимой блокады ЦОГ-1 и ЦОГ-2.

*Троксерутин* (тригидроксиэтилрутинозид) представляет собой биофлавоноид. Он относится к ангиопротекторным средствам. Уменьшает проницаемость капилляров и проявляет венотонизирующее действие. Блокирует венодилатирующее действие гистамина, брадикинина и ацетилхолина. Действует противовоспалительно на околовенозную ткань, уменьшает ломкость капилляров и обладает некоторым антиагрегантным действием.

Уменьшает отечность, улучшает трофику при патологических изменениях, связанных с венозной недостаточностью.

При нанесении на кожу Индовазин гель подавляет воспалительную отечную реакцию, снимает боль и температуру в очагах воспаления, находящихся на поверхности и в глубине, достигая расположенных там кровеносных сосудов. Проявляет венотонизирующее и капилляропротекторное действие.

***Фармакокинетика***

Используемая мазевая основа обеспечивает растворимость и высвобождение индометацина и троксерутина.

Гелевая лекарственная форма, в которую включены индометацин и троксерутин, хорошо всасывается с поверхности кожи и обеспечивает терапевтическое действие препарата.

При нанесении на кожу в подкожной клетчатке и околосуставных тканях создаются концентрации, близкие к терапевтическим. Проникновение активных компонентов препарата в системный кровоток клинически незначимо.

## Показания к применению:

— в комплексной терапии хронической венозной недостаточности нижних конечностей (варикозное расширение вен) - для снятия отека, чувства тяжести и боли в ногах;

— поверхностный тромбофлебит, флебит, послефлебитные состояния;

— ревматическое поражение мягких тканей: тендовагинит, бурсит, фиброзит, периартрит;

— при отеках после хирургических вмешательств, контузиях, вывихах, растяжениях.

## Относится к болезням:

- Бурсит
- Венозная недостаточность
- Вывих
- Вывихи
- Растяжение
- Ревматизм
- Тендовагинит
- Тромбоз
- Тромбофлебит
- Фиброз
- Фиброма
- Флебит

## Противопоказания:

— нарушение целостности кожных покровов;

— III триместр беременности;

— период лактации (грудного вскармливания);

— детский возраст до 14 лет (отсутствует клинический опыт применения);

— повышенная чувствительность к компонентам препарата и НПВП.

С *осторожностью:* одновременный прием препарата с другими НПВП, бронхиальная астма, аллергический ринит, полипы слизистой оболочки носа.

## Способ применения и дозы:

Препарат предназначен для наружного применения.

4-5 см геля наносят 3-4 раза/сут тонким слоем на пораженный участок легкими втирающими движениями. Общее суточное количество не должно превышать 20 см. Длительность лечения не должна превышать 10 дней.

## Побочное действие:

Переносимость препарата обычно хорошая.

*Местные реакции:* возможно появление симптомов повышенной чувствительности со стороны кожи - контактный дерматит, зуд, покраснение, сыпь, чувство тепла и жжения в месте нанесения.

## Передозировка:

Нет сведений о случаях передозировки при местном применении. При случайном проглатывании больших количеств возможно чувство жжения во рту, слюновыделение, тошнота, рвота.

*Лечение:* промывание ротовой полости и желудка, при необходимости - симптоматическое лечение.

## Применение при беременности и кормлении грудью:

Клинический опыт, доказывающий безопасность препарата при применении при беременности и в период кормления грудью, отсутствует. Его применение возможно лишь в случае, если ожидаемая польза превышает потенциальный риск для плода.

## Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Мазь может усиливать действие препаратов, вызывающих фотосенсибилизацию.

Клинически значимого взаимодействия с другими лекарственными средствами не описано.

## Особые указания и меры предосторожности:

Не наносится на открытые раны, слизистые оболочки, в ротовую полость, на глаза.

При попадании в глаза, на слизистые оболочки или открытые раневые поверхности наблюдается местное раздражение - слезоточивость, покраснение, жжение, боль.

Необходимые меры - промывание пораженного участка обильным количеством дистиллированной воды или физиологического раствора до исчезновения или уменьшения жалоб.

Индовазин гель содержит натрия бензоат и пропиленгликоль в качестве вспомогательных веществ, которые могут оказать раздражающее действие на кожу.

*Влияние на способность к вождению автотранспорта и управлению механизмами*

Не оказывает влияния на скорость психомоторных реакций при вождении и работе с механизмами.

***Применение в детском возрасте***

Противопоказан в детском возрасте до 14 лет.

## Условия хранения:

Препарат следует хранить в недоступном для детей, защищенном от света месте при температуре не выше 25°С.

## Срок годности:

2 года.

## Условия отпуска в аптеке:

Без рецепта.

**Источник:** http://drugs.thead.ru/Indovazin