

## Инфлюрин



### Полезные ссылки:

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#) [Апрель](#)  
[Госреестр](#) [Википедия](#)  
[РЛС VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)<sup>англ</sup>

### Фармакологические свойства:

#### **Фармакодинамика**

Сосудосуживающее средство для местного применения в ЛОР-практике. Альфа-адреномиметик. При нанесении на слизистые оболочки вызывает сужение сосудов, в результате этого уменьшается местная гиперемия и отек. При ринитах облегчает носовое дыхание.

#### **Фармакокинетика**

При местном применении практически не абсорбируется, концентрации в плазме настолько малы, что их невозможно определить современными аналитическими методами.

### Показания к применению:

Острый аллергический ринит, синусит, поллиноз, средний отит (для уменьшения отека слизистой носоглотки), подготовка пациента к диагностическим процедурам в носовых ходах.

### Относится к болезням:

- [Аллергический ринит](#)
- [Аллергия](#)
- [Поллиноз](#)
- [Ринит](#)
- [Синусит](#)

### Противопоказания:

Закрьюгольная глаукома, атрофический ринит, артериальная гипертензия, тахикардия, выраженный атеросклероз, гипертиреоз, хирургические вмешательства на мозговых оболочках (в анамнезе), повышенная чувствительность к ксилометазолину.

### Способ применения и дозы:

Применяют местно в течение 7-14 дней. Доза зависит от используемой лекарственной формы и возраста пациента.

**Побочное действие:**

*При частом и/или длительном применении:* раздражение слизистой, жжение, покалывание, чиханье, сухость слизистых носа, гиперсекреция.

*Редко:* отек слизистой оболочки носа (чаще при длительном применении), сердцебиение, нарушения сердечного ритма, повышение АД, головная боль, рвота, расстройства сна, нарушения зрения.

*При длительном применении в высоких дозах:* депрессивное состояние.

**Применение при беременности и кормлении грудью:**

При беременности и в период лактации следует применять только после тщательной оценки соотношения риска и пользы для матери и плода, не допускается превышения рекомендуемых доз.

**Взаимодействие с другими лекарственными средствами:**

Несовместим с ингибиторами MAO и трициклическими антидепрессантами.

**Особые указания и меры предосторожности:**

Не следует применять в течение длительного времени, например, при хроническом рините. При простудных заболеваниях в тех случаях, когда в носу образуются корки, предпочтительно назначать в виде геля.

*Использование в педиатрии*

С осторожностью назначают ксилометазолин детям в возрасте до 2 лет (гель – до 7 лет).

**Применение в детском возрасте**

С осторожностью назначают ксилометазолин детям в возрасте до 2 лет (гель – до 7 лет).

**Источник:** <http://drugs.thead.ru/Inflyurin>