

## [Ингалипт](#)



### Код АТХ:

- [R02AA20](#)

### Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- [Мяты перечной листьев масло](#)
- [Сульфаниламид](#)
- [Сульфатиазол](#)
- [Тимол](#)
- [Эвкалиптовое масло](#)

### Полезные ссылки:

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#) [Апрель](#)  
[Госреестр](#)<sup>мнн</sup> [мнн](#) [мнн](#) [мнн](#) [мнн](#) [Википедия](#)<sup>мнн</sup> [мнн](#) [мнн](#) [мнн](#) [мнн](#)  
[РЛС VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)<sup>англ</sup>

### Фармакотерапевтическая группа:

- [Противомикробные, противопаразитарные и противоглистные средства](#)
- [Противомикробные, противопаразитарные и противоглистные средства](#)

### Фармакологические свойства:

#### **Фармакодинамика**

Комбинированный препарат для местного применения. Входящие в состав препарата растворимые сульфаниламиды оказывают противомикробное действие (в отношении грамположительных и грамотрицательных бактерий, вызывающих заболевания полости рта). Тимол, эвкалиптовое масло и мяты перечной масло оказывают противогрибковый (в отношении грибов рода Candida), противомикробный, противовоспалительный и легкий обезболивающий эффект.

### Показания к применению:

Тонзиллит, фарингит, ларингит, афтозный стоматит.

### Относится к болезням:

- [Ларингит](#)
- [Стоматит](#)

### **Противопоказания:**

Гиперчувствительность.

### **Способ применения и дозы:**

Местно. Сняв предохранительный колпачок с флакона, распыляют взвесь в полость рта 1-2 с. Орошение проводится 3-4 раза в сутки с предварительным прополаскиванием рта кипяченой водой.

### **Побочное действие:**

Аллергические реакции, кратковременное ощущение жжения или першения.

**Источник:** <http://drugs.thead.ru/Ingalipt>