

Ингалипт (спрей)



Код АТХ:

- [R02AA20](#)

Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- [Мяты перечной листьев масло](#)
- [Сульфаниламид](#)
- [Сульфатиазол](#)
- [Тимол](#)
- [Эвкалиптовое масло](#)

Полезные ссылки:

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#) [Апрель](#)
[Госреестр](#)^{мнн} [мнн](#) [мнн](#) [мнн](#) [мнн](#) [Википедия](#)^{мнн} [мнн](#) [мнн](#) [мнн](#) [мнн](#)
[РЛС VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)^{англ}

Фармакотерапевтическая группа:

- [Противомикробные, противопаразитарные и противоглистные средства](#)
- [Противомикробные, противопаразитарные и противоглистные средства](#)

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Комбинированный препарат для местного применения. Входящие в состав препарата растворимые сульфаниламиды оказывают противомикробное действие (в отношении грамположительных и грамотрицательных бактерий, вызывающих заболевания полости рта). Тимол, эвкалиптовое масло и мяты перечной масло оказывают противогрибковый (в отношении грибов рода *Candida*), противомикробный, противовоспалительный и легкий обезболивающий эффект.

Показания к применению:

Тонзиллит, фарингит, ларингит, афтозный стоматит.

Относится к болезням:

- [Ларингит](#)
- [Стоматит](#)

Противопоказания:

Гиперчувствительность.

Способ применения и дозы:

Местно. Сняв предохранительный колпачок с флакона, распыляют взвесь в полость рта 1-2 с. Орошение проводится 3-4 раза в сутки с предварительным прополаскиванием рта кипяченой водой.

Побочное действие:

Аллергические реакции, кратковременное ощущение жжения или першения.

Источник: http://drugs.thead.ru/Ingalipt_sprey