Инокаин



Код АТХ:

- N01BA

Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- Оксибупрокаин

Полезные ссылки:

Цена в Яндексе Горздрав Столички Апрель
Госреестр[МНН] Википедия[МНН] Реестр ЕАЭС
РЛС VIDAL Mail.Ru Drugs.com[англ]

Форма выпуска:

Капли глазные 0.4% в виде прозрачного бесцветного раствора.

	1 мл
оксибупрокаина гидрохлорид	4 мг

Вспомогательные вещества: бензалкония хлорид, борная кислота, динатрия эдетат, натрия хлорид, вода д/и.

5 мл - флакон-капельницы пластиковые (1) - пачки картонные.
5 мл - флаконы темного стекла (1) в комплекте с капельницей - коробки картонные.

Фармакотерапевтическая группа:

- Нейротропные средства
- Органотропные средства

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Местный анестетик, блокирует нервные окончания. При местном применении хорошо проникает в ткани. По

сравнению с тетракаином и другими местными анестетиками оказывает менее выраженное раздражающее действие на конъюнктиву и роговицу.

Поверхностная анестезия конъюнктивы и роговицы после применения глазных капель наступает через 30 сек и сохраняется в течение 15 мин.

Фармакокинетика

Инокаин легко проникает в строму роговицы после однократной инстилляции его в конъюнктивальную полость. В течение последующих 15 мин наблюдается количественное снижение стромальной концентрации препарата, что обеспечивает 12-15 минутный период анестезии при однократной инстилляции.

Показания к применению:

Местная анестезия в офтальмологии:

— измерение внутриглазного давления (тонометрия);

— гониоскопия;

— диагностический соскоб конъюнктивы;

— извлечение инородных тел и швов из роговицы и конъюнктивы;

— кратковременные хирургические вмешательства на роговице и конъюнктиве.

Относится к болезням:

- Анестезия
- Конъюнктивит

Противопоказания:

— повышенная чувствительность к компонентам препарата.

Способ применения и дозы:

Препарат закапывают в конъюнктивальный мешок по 1 капле. Длительную анестезию (до 1 ч) обеспечивает 3-кратное закапывание с интервалом в 4-5 мин.

Побочное действие:

Возможно: кратковременное ощущение покалывания, жжение и гиперемия конъюнктивы, аллергические реакции.

Редко: кератит.

Передозировка:

Данные по передозировке препарата отсутствуют.

Применение при беременности и кормлении грудью:

Клинического опыта по применению препарата при беременности и в период лактации недостаточно. Применение Инокаина при беременности и в период грудного вскармливания возможно только в случаях, когда ожидаемая польза терапии для матери превышает потенциальный риск для плода или грудного ребенка.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

В литературе не описаны отрицательные или положительные эффекты при одновременном введении в конъюнктивальный мешок оксибупрокаина и других, традиционно применяемых глазных капель.

Отмечено, что оксибупрокаин теоретически может снижать антибактериальную активность сульфаниламидов.

Особые указания и меры предосторожности:

Препарат предназначен только для инстилляций в конъюнктивальный мешок. Не применять для инъекций.

Не предназначен для длительной терапии в комплексном лечении заболеваний глаз.

Продолжительное, многократное и длительное применение (как и других местных анестетиков) может привести к стойкому помутнению роговицы.

Во время анестезии необходимо защитить глаз от раздражающих химических воздействий, инородных тел и трения.

Использование в педиатрии

Достаточного опыта по применению препарата у детей нет. Применение Инокаина у детей возможно только в случаях, когда ожидаемая польза терапии превышает риск развития возможных побочных эффектов.

Условия хранения:

Препарат следует хранить в защищенном от света и недоступном для детей месте, при температуре не выше 25°C; не замораживать.

После вскрытия флакона препарат следует использовать в течение 1 месяца.

Срок годности:

2 года.

Условия отпуска в аптеке:

По рецепту.

Источник: http://drugs.thead.ru/Inokain