Инсти

Полезные ссылки:

Цена в Яндексе Горздрав Столички Апрель
Госреестр Википедия
РЛС VIDAL Mail.Ru Drugs.com[англ]

Форма выпуска:

◊ ***Гранулы для приготовления раствора для приема внутрь*** коричневого цвета, со слабым запахом ментола при растирании.

	1 саше (5.6 г)
густой водный экстракт	400 мг,
приготовленный из:	
коры ивы белой	750 мг
листьев адхатоды сосудистой	300 мг
листьев и цветков фиалки пахучей	100 мг
корней и корневищ солодки голой	550 мг
листьев чая китайского	125 мг
плодов фенхеля обыкновенного	75 мг
листьев эвкалипта шаровидного	35 мг
корневищ валерианы лекарственной	100 мг

Вспомогательные вещества: ментол, крахмал кукурузный, сахароза.

5.6 г - саше (пакет из трехслойной фольги) (5) - пачки картонные.

◊ ***Гранулы для приготовления раствора для приема внутрь*** коричневого цвета, с запахом аниса при растирании.

	1 саше (5.6 г)
густой водный экстракт	400 мг,
приготовленный из:	
коры ивы белой	750 мг
листьев адхатоды сосудистой	300 мг
листьев и цветков фиалки пахучей	100 мг
корней и корневищ солодки голой	550 мг
листьев чая китайского	125 мг
плодов фенхеля обыкновенного	75 мг
листьев эвкалипта шаровидного	35 мг
корневищ валерианы лекарственной	100 мг

Вспомогательные вещества: ментол, крахмал кукурузный, сахароза, масло семян аниса.

5.6 г - саше (пакет из трехслойной фольги) (5) - пачки картонные.

◊ ***Гранулы для приготовления раствора для приема внутрь*** коричневого цвета, с запахом кардамона при растирании.

	1 саше (5.6 г)
густой водный экстракт	400 мг,
приготовленный из:	
коры ивы белой	750 мг
листьев адхатоды сосудистой	300 мг
листьев и цветков фиалки пахучей	100 мг

корней и корневищ солодки голой	550 мг
листьев чая китайского	125 мг
плодов фенхеля обыкновенного	75 мг
листьев эвкалипта шаровидного	35 мг
корневищ валерианы лекарственной	100 мг

Вспомогательные вещества: ментол, крахмал кукурузный, сахароза, масло плодов кардамона.

5.6 г - саше (пакет из трехслойной фольги) (5) - пачки картонные.

◊ ***Гранулы для приготовления раствора для приема внутрь*** коричневого цвета, с запахом кофе при растирании.

	1 саше (5.6 г)
густой водный экстракт	400 мг,
приготовленный из:	
коры ивы белой	750 мг
листьев адхатоды сосудистой	300 мг
листьев и цветков фиалки пахучей	100 мг
корней и корневищ солодки голой	550 мг
листьев чая китайского	125 мг
плодов фенхеля обыкновенного	75 мг
листьев эвкалипта шаровидного	35 мг
корневищ валерианы лекарственной	100 мг

Вспомогательные вещества: ментол, крахмал кукурузный, сахароза, ароматизатор кофейный (Кофе Д-0818).

5.6 г - саше (пакет из трехслойной фольги) (5) - пачки картонные.

◊ ***Гранулы для приготовления раствора для приема внутрь*** коричневого цвета, с запахом лимона при растирании.

	1 саше (5.6 г)
густой водный экстракт	400 мг,
приготовленный из:	
коры ивы белой	750 мг
листьев адхатоды сосудистой	300 мг
листьев и цветков фиалки пахучей	100 мг
корней и корневищ солодки голой	550 мг
листьев чая китайского	125 мг
плодов фенхеля обыкновенного	75 мг
листьев эвкалипта шаровидного	35 мг
корневищ валерианы лекарственной	100 мг

Вспомогательные вещества: ментол, крахмал кукурузный, сахароза, ароматизатор лимонный (Лимон Лайм С-8946).

5.6 г - саше (пакет из трехслойной фольги) (5) - пачки картонные.

◊ ***Гранулы для приготовления раствора для приема внутрь*** коричневого цвета, с запахом шоколада при растирании.

	1 саше (5.6 г)
густой водный экстракт	400 мг,
приготовленный из:	
коры ивы белой	750 мг
листьев адхатоды сосудистой	300 мг
листьев и цветков фиалки пахучей	100 мг
корней и корневищ солодки голой	550 мг
листьев чая китайского	125 мг
плодов фенхеля обыкновенного	75 мг
листьев эвкалипта шаровидного	35 мг
корневищ валерианы лекарственной	100 мг

Вспомогательные вещества: ментол, крахмал кукурузный, сахароза, ароматизатор шоколадный (Шоколад Д-0970), какао порошок.

5.6 г - саше (пакет из трехслойной фольги) (5) - пачки картонные.

Фармакотерапевтическая группа:

- Ненаркотические анальгетики, включая нестероидные и другие противовоспалительные средства

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Комбинированный растительный препарат, применяемый при простудных заболеваниях.

Оказывает отхаркивающее, противовоспалительное, муколитическое, а также жаропонижающее действие.

Фармакокинетика

В соответствии с Международной конвенцией (EMEAHMPWG11/99) при проведении клинических испытаний препаратов растительного происхождения не требуется изолированное исследование фармакокинетических параметров.

Показания к применению:

— симптоматическая терапия ОРВИ (при повышении температуры тела до 38°С, головной боли, заложенности носа, болезненности при глотании, кашле).

Противопоказания:

— беременность;

— период лактации (грудного вскармливания);

— детский и подростковый возраст до 18 лет;

— повышенная чувствительность к компонентам препарата.

С *осторожностью* применяют препарат при тяжелых нарушениях функции печени, почек, сердечно-сосудистой системы, повышенной свертываемости крови.

Способ применения и дозы:

Взрослым внутрь по 1 саше 2-3 раза/сут после приема пищи. Курс лечения составляет 7-8 дней.

Содержимое 1 саше следует растворить в стакане горячей воды и медленно выпить.

Увеличение продолжительности курса лечения возможно по рекомендации врача.

Побочное действие:

Возможно: аллергические реакции.

Передозировка:

До настоящего времени о случаях передозировки препарата Инсти не сообщалось.

Применение при беременности и кормлении грудью:

Препарат противопоказан к применению при беременности и в период лактации (грудного вскармливания).

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Не рекомендуется одновременное применение Инсти с противокашлевыми лекарственными средствами, а также с препаратами, уменьшающими образование мокроты, поскольку возможно затруднение откашливания разжиженной мокроты.

Особые указания и меры предосторожности:

В состав гранул входит сахароза (5.13 г в разовой дозе), что необходимо учитывать при назначении препарата пациентам с сахарным диабетом, а также при низкокалорийной диете.

Пациент должен быть предупрежден о необходимости прекращения приема препарата и обращения к врачу при повышении температуры тела выше 38°C, усилении кашля, появлении хрипов в легких, гнойной мокроты, ринореи с гнойным отделяемым, ангины.

При нарушениях функции почек

С осторожностью применяют препарат при тяжелых нарушениях функции печени.

При нарушениях функции печени

С осторожностью применяют препарат при тяжелых нарушениях функции почек.

Условия хранения:

Препарат следует хранить в недоступном для детей месте при температуре не выше 25°C.

Срок годности:

3 года.

Условия отпуска в аптеке:

Без рецепта.

Источник: http://drugs.thead.ru/Insti