

[Инсуман Комб 25 Гт](#)



Полезные ссылки:

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#) [Апрель](#)

[Госреестр](#) [Википедия](#)

[РЛС VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)^{англ}

Форма выпуска:

Форма выпуска, описание и состав

Суспензия для п/к введения белого или почти белого цвета, легко диспергируемая.

	1 мл
смесь инсулина человеческого растворимого и суспензии инсулина изофана	100 ME
в т.ч. инсулин человеческий растворимый 25 ME суспензия инсулина изофана 75 ME	

Вспомогательные вещества: протамина сульфат, m-крезол, фенол, цинка хлорид, натрия дигидрофосфата дигидрат, глицерол 85%, натрия гидроксид, хлороводородная кислота концентрированная (для доведения pH), вода д/и.

3 мл - картриджи бесцветного стекла (5) - пачки картонные.

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Инсулин, идентичный инсулину человека, с быстронаступающим эффектом и средней продолжительности действия. Понижает уровень глюкозы в крови, усиливает ее усвоение тканями, усиливает липогенез, гликогеногенез, синтез белка, снижает скорость продукции глюкозы печенью. Начало действия - через 30 мин после введения, максимальный эффект - в промежутке между 2 и 8 ч, продолжительность действия 24 ч.

Показания к применению:

Сахарный диабет типа 1 (инсулинзависимый).

Сахарный диабет типа 2 (инсулиннезависимый), в т.ч. при полной или частичной резистентности к пероральным гипогликемическим средствам (комбинированная терапия); при интеркуррентных заболеваниях, оперативных вмешательствах; при беременности (при неэффективности диетотерапии).

Относится к болезням:

- [Гипогликемия](#)
- [Инсульт](#)

Противопоказания:

Гипогликемия, инсулинома, повышенная чувствительность к данному инсулину.

Способ применения и дозы:

Дозу устанавливают индивидуально. Вводят п/к.

Побочное действие:

Побочные эффекты, связанные с влиянием на углеводный обмен: гипогликемические состояния (бледность, усиление потоотделения, ощущение сердцебиения, расстройства сна, тремор).

Аллергические реакции: редко - кожная сыпь; крайне редко - ангионевротический отек.

Местные реакции: редко - гиперемия и зуд в месте инъекции препарата; при длительном применении редко - липодистрофия в месте инъекции.

Применение при беременности и кормлении грудью:

При беременности и в период лактации потребность в инсулине изменяется, что следует учитывать для поддержания адекватного контроля обмена веществ.

Инсулин не проникает через плацентарный барьер.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Диагнозы

- Аденогенитальный синдром
- Акромегалия
- Гестационный сахарный диабет
- Гинекомастия у мужчин

Особые указания и меры предосторожности:

Переход с одного вида инсулина на другой следует проводить под контролем уровня глюкозы в крови.

При передозировке инсулина, если больной в сознании, необходимо ввести глюкозу перорально; при потере сознания вводят глюкозу в/в или глюкагон п/к, в/м или в/в.

Влияние на способность к вождению автотранспорта и управлению механизмами

При переводе пациента на данный инсулин возможно временное снижение скорости психомоторных реакций.

При первичном применении инсулина, смене его вида или при наличии значительных физических или психических стрессов возможно снижение скорости психомоторных реакций и способности к концентрации внимания.

Источник: http://drugs.thead.ru/Insuman_Komb_25_Gt