

## Иохимбин "шпигель"



### Полезные ссылки:

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#)

[Госреестр](#) [Википедия](#)

[РЛС VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)<sup>англ</sup>

### Форма выпуска:

**Таблетки** белые, круглые, плоские, со скошенными краями.

	<b>1 таб.</b>
Иохимбина гидрохлорид	5 мг

*Вспомогательные вещества:* крахмал кукурузный, гуммиарабик, лактозы моногидрат, сахароза, стеариновая кислота, тальк.

20 шт. - флаконы стеклянные (1) - пачки картонные.

100 шт. - флаконы стеклянные (1) - пачки картонные.

### Фармакологические свойства:

#### **Фармакодинамика**

Альфа<sub>2</sub>-адреноблокатор, влияет преимущественно на пресинаптические центральные и периферические альфа<sub>2</sub>-адренорецепторы. Улучшает кровоснабжение органов малого таза. Активирует адренергические нейроны центральной нервной системы (что может сопровождаться повышением артериального давления), двигательную активность и реакционную способность.

Повышает либидо и потенцию. Оказывает антидиуретическое действие, вызывает увеличение частоты сердечных сокращений и снижение артериального давления (за счет блокады периферических альфа<sub>2</sub>-адренорецепторов).

#### **Фармакокинетика**

Быстро и полностью всасывается из желудочно-кишечного тракта. C<sub>max</sub> достигается через 1,3 часа.

Через 10 минут после приема внутрь проникает через гематоэнцефалический барьер, около 17% определяется в тканях головного мозга в течение 6 часов.

Метаболизируется в печени. T<sub>1/2</sub> - 0,6 часа.

### Показания к применению:

— психогенная импотенция;

— функциональная импотенция (сопровождающаяся расстройствами эрекции);

— атония мочевого пузыря, климакс у мужчин.

## Относится к болезням:

- [Импотенция](#)

## Противопоказания:

- повышенная чувствительность к препарату;
- печеночная и/или почечная недостаточность;
- артериальная гипертензия или гипотензия;
- ишемическая болезнь сердца;
- одновременный прием адреностимуляторов.

*С осторожностью:* язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки, психические заболевания.

## Способ применения и дозы:

Внутрь, по 1-2 таблетки (5-10 мг) 1-3 раза в сутки, во время еды, не разжевывая и запивая стаканом воды. Курс лечения 3-10 недель. При необходимости курс можно повторить не ранее, чем через 10 недель.

## Побочное действие:

Головокружение, головная боль, тревожность, мигрень, тремор рук, рвота, диарея, гастралгия, снижение или повышение артериального давления, ортостатическая гипотензия, тахикардия.

## Передозировка:

*Симптомы:* общая слабость, генерализованная парестезия, нарушения памяти и координации движения, головная боль, головокружение, тремор, тахикардия, повышение артериального давления, чувство страха, галлюцинации, тошнота, рвота, мидриаз, слюно-и слезотечение, повышенная потливость, повышение уровня норадреналина в плазме крови.

*Лечение:* антидот - клонидин; назначают внутрь в начальной дозе 0,1-0,2 мг, затем повторно с часовыми интервалами в дозе 0,1 мг. Симптоматическое лечение: антигипертензивные средства; для устранения чувства страха или галлюцинаций назначают бензодиазепины (нельзя назначать нейролептики фенотиазинового ряда).

## Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

При одновременном приеме с клонидином - ослабление эффекта обоих препаратов. Возможно снижение эффективности гипотензивных лекарственных средств, алпрозолама. Усиливает действие антидепрессантов. Кломипрамин повышает концентрацию иохимбина гидрохлорида в плазме крови.

## Особые указания и меры предосторожности:

Не рекомендуется сочетать с антидепрессантами и другими тимолептическими лекарственными средствами.

*Влияние на способность к управлению транспортными средствами и использованию механизмов*

В период лечения необходимо воздерживаться от вождения автотранспорта и занятий потенциально опасными видами деятельности, требующими повышенной концентрации внимания, остроты и быстроты психомоторных реакций.

**При нарушениях функции почек**

## **Иохимбин "шпигель"**

Фармакологическая база данных (<http://drugs.thead.ru>)

---

Противопоказано при почечной недостаточности.

### ***При нарушениях функции печени***

Противопоказано при печеночной недостаточности.

## **Условия хранения:**

Список Б. В сухом месте при температуре не выше 25°C. Хранить в недоступном для детей месте!

## **Срок годности:**

5 лет.

## **Условия отпуска в аптеке:**

По рецепту.

**Источник:** [http://drugs.thead.ru/lohimbin\\_shpigel](http://drugs.thead.ru/lohimbin_shpigel)