Иралгезик



Полезные ссылки:

Цена в Яндексе Горздрав Столички Апрель
Госреестр Википедия Реестр ЕАЭС
РЛС VIDAL Mail.Ru Drugs.com[англ]

Форма выпуска:

◊***Таблетки***	**1 таб.**
ацетилсалициловая кислота	325 мг
парацетамол	162.5 мг
кофеин	32.5 мг

Вспомогательные вещества: кремния диоксид коллоидный, желатин, тальк, магния стеарат, лактозы моногидрат, плаздон, крахмал кукурузный, красный №3.

10 шт. - стрипы (3) - пачки картонные.
10 шт. - стрипы (10) - пачки картонные.

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Комбинированный препарат, оказывает анальгезирующее, жаропонижающее и противовоспалительное действие.

Ацетилсалициловая кислота - НПВС, обладает анальгезирующим, жаропонижающим и противовоспалительным действием.

Парацетамол - анальгетик-антипиретик, уменьшает болевой синдром, наблюдающийся при простудных заболеваниях (боль в горле, головную боль, мышечную и суставную боль), оказывает жаропонижающее действие.

Кофеин обладает стимулирующим влиянием на ЦНС, уменьшает чувство усталости, сонливость, увеличивает ЧСС и повышает АД при артериальной гипотензии.

Фармакокинетика

Данные по фармакокинетике препарата Иралгезик не предоставлены.

Показания к применению:

— умеренный или слабовыраженный болевой синдром (в т.ч. головная боль, зубная боль, боли в суставах, невралгия, миалгия, дисменорея);

— лихорадка при простудных и других инфекционно-воспалительных заболеваниях.

Относится к болезням:

- Болевой синдром
- Боли в суставах
- Дисменорея
- Зубная боль
- Инфекции
- Лихорадка
- Миалгия
- Невралгия
- Неврит

Противопоказания:

— язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки;

— желудочно-кишечные кровотечения;

— выраженные нарушения функции печени;

— выраженные нарушения функции почек;

— генетическое отсутствие глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы;

— заболевания крови со склонностью к кровоизлияниям и кровотечениям;

— глаукома;

— бронхиальная астма;

— беременность;

— лактация;

— повышенная чувствительность к компонентам препарата.

Препарат не назначают детям в возрасте до 15 лет с ОРВИ и гриппом из-за опасности развития синдрома Рейе.

Способ применения и дозы:

Назначают внутрь после еды по 1-2 таб. 2-3 раза/сут.

Максимальная доза - 6 таб./сут. Интервал между приемами - не менее 6 ч.

При нарушениях функции почек или печени перерыв между приемами препарата должен быть не менее 8 ч.

Препарат не следует принимать более 5 дней в качестве анальгезирующего средства и более 3 дней - в качестве жаропонижающего средства.

Необходимость применения препарата в других дозах и по другим схемам врач решает индивидуально.

Побочное действие:

Со стороны пищеварительной системы: тошнота, боли в области желудка; при длительном применении в высоких дозах - нарушения функции печени.

Аллергические реакции: кожная сыпь, зуд, крапивница.

Прочие: тахикардия, головокружение; при длительном применении в высоких дозах - нарушение функции почек.

Передозировка:

Симптомы: тошнота, рвота, боли в желудке, повышенное потоотделение, бледность кожных покровов, тахикардия.

Лечение: промывание желудка, назначение активированного угля, проведение симптоматической терапии.

Применение при беременности и кормлении грудью:

Препарат противопоказан при беременности и в период лактации.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Препарат усиливает действие антикоагулянтов и антиагрегантов, а также побочное действие ГКС, производных сульфонилмочевины, метотрексата, неопиоидных анальгетиков, НПВС.

Особые указания и меры предосторожности:

С осторожностью применяют у пациентов пожилого возраста, при нарушениях функции печени или почек.

Не следует назначать Иралгезик в комбинации с барбитуратами, противосудорожными средствами, рифампицином.

Не принимать препарат одновременно с алкоголем.

При необходимости одновременного применения других препаратов пациент должен проконсультироваться с врачом.

Использование в педиатрии

Препарат не назначают **детям в возрасте до 15 лет** с ОРВИ и гриппом из-за опасности развития синдрома Рейе.

При нарушениях функции почек

При нарушениях функции почек перерыв между приемами препарата должен быть не менее 8 ч.

При нарушениях функции печени

При нарушениях функции печени перерыв между приемами препарата должен быть не менее 8 ч.

Применение в детском возрасте

Препарат не назначают детям в возрасте до 15 лет с ОРВИ и гриппом из-за опасности развития синдрома Рейе.

Условия хранения:

Препарат следует хранить в недоступном для детей, сухом, защищенном от света месте при температуре ниже 30°С.

Срок годности:

2 года.

Условия отпуска в аптеке:

Без рецепта.

Источник: http://drugs.thead.ru/Iralgezik