

[Ирикар](#)



Полезные ссылки:

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#)
[Госреестр](#) [Википедия](#)
[РЛС VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)^{англ}

Форма выпуска:

◇ **Мазь для наружного применения** гомогенная, светло-желтого цвета; возможно незначительное выделение масла светло-желтого цвета в области отверстия тубы, что не является признаком нестабильности и безопасно.

	10 г
матричная настойка <i>Cardiospermum halicacabum</i>	1 г

Вспомогательные вещества: ланолин, мазь спиртовая на основе ланолина (из спиртов на основе ланолина, вазелина белого, цетилстеаринового спирта), парафин густой, вода очищенная.

50 г - тубы алюминиевые (1) - пачки картонные.

Фармакотерапевтическая группа:

- [Органотропные средства](#)

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Инструкция по медицинскому применению одобрена фармакологическим комитетом МЗ РФ 25.05.2000

Гомеопатическое лекарственное средство для наружного применения.

Показания к применению:

Применяется в дерматологии в комплексной терапии при лечении воспалительных заболеваний кожи, сопровождающихся зудом:

- экзема;
- нейродермит;
- атопический дерматит.

Относится к болезням:

Ирикар

Фармакологическая база данных (<http://drugs.thead.ru>)

- [Дерматит](#)
- [Зуд](#)

Противопоказания:

Не рекомендуется применять лекарство в случае непереносимости ингредиентов мазевой основы, например, спирта на основе ланолина.

Способ применения и дозы:

Взрослым и детям старше 1 года мазь Ирикар наносить на пораженные участки кожи тонким слоем, слегка втирая, 3 раза в день. При отсутствии терапевтического эффекта в течение 2 недель необходимо обратиться к врачу.

Побочное действие:

В редких случаях могут наблюдаться аллергические реакции кожи на ингредиенты мазевой основы.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Применение гомеопатических препаратов не исключает использование других лекарственных средств.

Особые указания и меры предосторожности:

При применении гомеопатических лекарств возможно возникновение временного первичного ухудшения. В этом случае следует прекратить прием препарата и проконсультироваться у врача.

Применение в детском возрасте

Детям старше 1 года мазь Ирикар наносить на поражённые участки кожи тонким слоем, слегка втирая, 3 раза в день.

Условия хранения:

Хранить при температуре не выше 25°C и не ниже 0°C в недоступном для детей месте. Не использовать после указанного на упаковке срока годности.

Срок годности:

5 лет.

Условия отпуска в аптеке:

Без рецепта.

Источник: <http://drugs.thead.ru/Irikar>