

Изофра



Код АТХ:

- [R01AX08](#)

Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- [Фрамицетин](#)

Полезные ссылки:

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#) [Апрель](#)

[Госреестр](#)^{МНН} [Википедия](#)^{МНН}

[РЛС](#) [VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)^{англ}

Форма выпуска:

Спрей назальный 1.25%	1 мл
фрамицетина сульфат	12.5 мг (8 тыс. МЕ)

Вспомогательные вещества: метилпарагидроксibenзоат, натрия хлорид, лимонная кислота, вода дистиллированная.

15 мл - флаконы полиэтиленовые (1) в комплекте с распылителем - пачки картонные.

Фармакотерапевтическая группа:

- [Противомикробные, противопаразитарные и противоглистные средства](#)

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Антибиотик из группы аминогликозидов для местного применения в оториноларингологии. Действует бактерицидно. Активен в отношении грамположительных и грамотрицательных бактерий, вызывающих развитие инфекционных процессов в верхних отделах дыхательных путей.

Фармакокинетика

Исследования фармакокинетики препарата Изофра не проводились в связи с низкой системной абсорбцией.

Показания к применению:

В составе комбинированной терапии при инфекционно-воспалительных заболеваниях верхних отделов дыхательных путей, в т.ч.:

- риниты;
- ринофарингиты;
- синуситы (при отсутствии повреждений перегородки).

Профилактика и лечение воспалительных процессов после оперативных вмешательств.

Относится к болезням:

- [Инфекции](#)
- [Ринит](#)
- [Ринофарингит](#)
- [Синусит](#)

Противопоказания:

- повышенная чувствительность к фрамицетину и другим антибиотикам из группы аминогликозидов.

Способ применения и дозы:

Взрослым назначают по 1 впрыскиванию в каждую ноздрю 4-6 раз/сут.

Детям назначают по 1 впрыскиванию в каждую ноздрю 3 раза/сут.

Средняя продолжительность курса терапии - 7 дней.

При употреблении флакон следует держать в вертикальном положении.

Побочное действие:

Аллергические реакции: в единичных случаях - кожные проявления.

Передозировка:

В связи с низкой степенью абсорбции в системный кровоток передозировка маловероятна.

Применение при беременности и кормлении грудью:

Адекватных и строго контролируемых клинических исследований безопасности применения препарата Изофра при беременности и в период лактации (грудного вскармливания) не проводилось.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Клинически значимых взаимодействий препарата Изофра с другими лекарственными средствами не выявлено.

Особые указания и меры предосторожности:

Если в течение 7 дней лечения терапевтический эффект отсутствует или выражен слабо, препарат необходимо отменить.

Применение в детском возрасте

Применение возможно согласно режиму дозирования.

Условия хранения:

Препарат следует хранить при температуре не выше 25°C.

Срок годности:

3 года.

Условия отпуска в аптеке:

По рецепту.

Источник: <http://drugs.thead.ru/lzofra>