

КАПСИКАМ



Код АТХ:

- [M02AX10](#)

Полезные ссылки:

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#)
[Госреестр](#) [Википедия](#)
[РЛС VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)^{англ}

Форма выпуска:

Мазь для наружного применения	1 г
бензилникотинат	20 мг
нонивамид (ваниллилнонамид)	2 мг
камфора рацемическая	30 мг
скипидар живичный	30 мг
диметилсульфоксид	50 мг

Вспомогательные вещества: бронопол, полисорбат 80, натрия цетилстеарилсульфат, спирт цетилстеариловый, эмульгатор тип А, вода очищенная.

30 г - тубы алюминиевые (1) - пачки картонные.

50 г - тубы алюминиевые (1) - пачки картонные.

Фармакотерапевтическая группа:

- [Нейротропные средства](#)

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Комбинированный препарат для наружного применения. Оказывает местнораздражающее, анальгезирующее и противовоспалительное действие.

Фармакокинетика

Данные по фармакокинетике препарата Капсикам не предоставлены.

Показания к применению:

- миалгии;
- артралгии;
- в качестве разогревающей мази у спортсменов.

Относится к болезням:

- [Артралгия](#)
- [Артрит](#)
- [Артроз](#)
- [Миалгия](#)

Противопоказания:

- кожные заболевания;
- беременность;
- лактация (грудное вскармливание);
- детский возраст;
- повышенная чувствительность к компонентам препарата.

Способ применения и дозы:

Применяют наружно.

При *миалгиях* и *артралгиях* - 1-3 г мази наносят на область болезненного участка и слегка втирают в кожу 2-3 раза/сут. Длительность курса лечения зависит от характера и тяжести заболевания и составляет в среднем 10 дней.

При применении *в качестве разогревающего средства у спортсменов* перед физической нагрузкой на соответствующие мышцы наносят небольшое количество мази (примерно 2-3 г) и втирают массирующими движениями до легкого покраснения кожи. После тренировки следует смыть мазь с кожи прохладной водой.

После каждой процедуры следует вымыть руки водой с мылом.

Побочное действие:

Аллергические реакции: возможны зуд, отек или крапивница.

Передозировка:

Данные о передозировке препарата Капсикам не предоставлены.

Применение при беременности и кормлении грудью:

Препарат противопоказан к применению при беременности и в период лактации.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

КАПСИКАМ

Фармакологическая база данных (<http://drugs.thead.ru>)

Данные о лекарственном взаимодействии препарата Капсикам не предоставлены.

Особые указания и меры предосторожности:

Следует избегать попадания мази на открытые раны и слизистые оболочки. Во избежание побочных явлений рекомендуется предварительно нанести небольшое количество мази на кожу для определения чувствительности к препарату.

Применение в детском возрасте

Препарат противопоказан в детском возрасте.

Условия хранения:

Препарат следует хранить в недоступном для детей, прохладном месте при температуре от 8° до 15°С.

Срок годности:

2 года.

Условия отпуска в аптеке:

Без рецепта.

Источник: <http://drugs.thead.ru/KAPSIKAM>