КАПСИКАМ



Код АТХ:

- M02AX10

Полезные ссылки:

Цена в Яндексе Горздрав Столички Апрель
Госреестр Википедия Реестр ЕАЭС
РЛС VIDAL Mail.Ru Drugs.com[англ]

Форма выпуска:

◊ ***Мазь для наружного применения***	**1 г**
бензилникотинат	20 мг
нонивамид (ваниллилнонамид)	2 мг
камфора рацемическая	30 мг
скипидар живичный	30 мг
диметилсульфоксид	50 мг

Вспомогательные вещества: бронопол, полисорбат 80, натрия цетилстеарилсульфат, спирт цетилстеариловый, эмульгатор тип А, вода очищенная.

30 г - тубы алюминиевые (1) - пачки картонные.
50 г - тубы алюминиевые (1) - пачки картонные.

Фармакотерапевтическая группа:

- Нейротропные средства

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Комбинированный препарат для наружного применения. Оказывает местнораздражающее, анальгезирующее и противовоспалительное действие.

Фармакокинетика

Данные по фармакокинетике препарата Капсикам не предоставлены.

Показания к применению:

— миалгии;

— артралгии;

— в качестве разогревающей мази у спортсменов.

Относится к болезням:

- Артралгия
- Артрит
- Артроз
- Миалгия

Противопоказания:

— кожные заболевания;

— беременность;

— лактация (грудное вскармливание);

— детский возраст;

— повышенная чувствительность к компонентам препарата.

Способ применения и дозы:

Применяют наружно.

При *миалгиях и артралгиях* - 1-3 г мази наносят на область болезненного участка и слегка втирают в кожу 2-3 раза/сут. Длительность курса лечения зависит от характера и тяжести заболевания и составляет в среднем 10 дней.

При применении *в качестве разогревающего средства у спортсменов* перед физической нагрузкой на соответствующие мышцы наносят небольшое количество мази (примерно 2-3 г) и втирают массирующими движениями до легкого покраснения кожи. После тренировки следует смыть мазь с кожи прохладной водой.

После каждой процедуры следует вымыть руки водой с мылом.

Побочное действие:

Аллергические реакции: возможны зуд, отек или крапивница.

Передозировка:

Данные о передозировке препарата Капсикам не предоставлены.

Применение при беременности и кормлении грудью:

Препарат противопоказан к применению при беременности и в период лактации.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Данные о лекарственном взаимодействии препарата Капсикам не предоставлены.

Особые указания и меры предосторожности:

Следует избегать попадания мази на открытые раны и слизистые оболочки. Во избежание побочных явлений рекомендуется предварительно нанести небольшое количество мази на кожу для определения чувствительности к препарату.

Применение в детском возрасте

Препарат противопоказан в детском возрасте.

Условия хранения:

Препарат следует хранить в недоступном для детей, прохладном месте при температуре от 8° до 15°С.

Срок годности:

2 года.

Условия отпуска в аптеке:

Без рецепта.

Источник: http://drugs.thead.ru/KAPSIKAM