Кальцекс

Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- Метенамина кальция хлорид

Полезные ссылки:

Цена в Яндексе Горздрав Столички Апрель
Госреестр[МНН] Википедия[МНН]
РЛС VIDAL Mail.Ru Drugs.com[англ]

Форма выпуска:

◊ ***Таблетки***	**1 таб.**
метенамина кальция хлорид	500 мг

10 шт. - упаковки ячейковые контурные.
10 шт. - упаковки ячейковые контурные (1) - пачки картонные.
10 шт. - упаковки ячейковые контурные (2) - пачки картонные.
10 шт. - пробирки стеклянные.

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Действие этого комплексного препарата обусловлено его составляющими. Метенамин относится к классу антисептиков и дезинфицирующих средств, к группе альдегидов. Действие основано на способности препарата разлагаться в кислой среде с образованием формальдегида, который обладает в данном случае антисептическим и противовоспалительным свойствами.

Комплексная соль метенамина присутствует для восполнения дефицита ионов кальция, для уменьшения проницаемости сосудистой стенки (что характерно для любого воспаления).

Показания к применению:

— симптоматическое лечение острых респираторных заболеваний и «простудных» заболеваний (в составе комплексной терапии).

Относится к болезням:

- Острые респираторные заболевания

Противопоказания:

— гипоапидность желудочного сока;

— печеночная недостаточность;

— хроническая почечная недостаточность;

— беременность;

— период лактации;

— детский возраст;

— гиперчувствительность.

Способ применения и дозы:

Препарат следует принимать **взрослым** при начальных симптомах простуды. Внутрь по 1 -2 таблетки 3-4 раза/сут. Курс лечения - 3-5 дней.

Побочное действие:

Возможны диспепсические расстройства, при появлении которых прием препарата следует прекратить.

Передозировка:

Симптомы: резкое раздражение конъюнктивы и слизистых оболочек дыхательных путей, диспепсические расстройства (тошнота, рвота, диарея), гломерулонефрит.

Лечение: рекомендуется прием тиоктовой кислоты, фолиевой кислоты, аскорбиновой кислоты, пиридоксина и препаратов никотиновой кислоты.

Применение при беременности и кормлении грудью:

Противопоказан во время беременности и в период лактации.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Не описано.

Особые указания и меры предосторожности:

При нарушениях функции почек

Противопоказан при хронической почечной недостаточности.

При нарушениях функции печени

Противопоказан при печеночной недостаточности.

Применение в детском возрасте

Противопоказан в детском возрасте.

Условия хранения:

В сухом месте при температуре не выше 25°C. Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности:

4 года.

Условия отпуска в аптеке:

По рецепту.

Источник: http://drugs.thead.ru/Kalceks