Кальцемин



Код АТХ:

- A12AX

Полезные ссылки:

Цена в Яндексе Горздрав Столички Апрель
Госреестр Википедия Реестр ЕАЭС
РЛС VIDAL Mail.Ru Drugs.com[англ]

Форма выпуска:

◊ ***Таблетки, покрытые оболочкой*** белого цвета, вытянутой капсуловидной формы, с выдавленной на одной из сторон насечкой.

	1 таб.
кальций (в форме цитрата и карбоната)	250 мг
колекальциферол (вит. D_3)	50 МЕ
медь (в форме оксида)	500 мкг
цинк (в форме оксида)	2 мг
марганец (в форме сульфата)	500 мкг
бор (в форме натрия бората)	50 мкг

Вспомогательные вещества: мальтодекстрин - 21.37 мг, целлюлоза микрокристаллическая - 200 мг, кроскармеллоза натрия - 28 мг, акация - 21.37 мг, стеариновая кислота - 35 мг, полисахарид сои - 10 мг, магния стеарат - 10 мг.

Состав оболочки: гидроксипропилметилцеллюлоза (гипромеллоза) - 11.01 мг, магния силикат - 5 мг, титана диоксид - 7.03 мг, натрия лаурилсульфат - 5.42 мг, кремния диоксид - 3.9 мг, полиэтиленгликоль - 2.53 мг, масло минеральное - 1.27 мг.

30 шт. - флаконы полиэтиленовые (1) - пачки картонные.
60 шт. - флаконы полиэтиленовые (1) - пачки картонные.
120 шт. - флаконы полиэтиленовые (1) - пачки картонные.

Фармакотерапевтическая группа:

- Метаболики

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Комбинированный препарат. Регулирует фосфорно-кальциевый обмен. Восполняет дефицит микроэлементов, кальция и витамина D_3, способствует укреплению костей и суставов, предупреждает заболевания опорно-двигательного аппарата.

Фармакокинетика

Данные о фармакокинетике препарата Кальцемин не предоставлены.

Показания к применению:

— профилактика и лечение остеопороза различного генеза;

— восполнение дефицита кальция и микроэлементов у подростков;

— восполнение дефицита кальция и микроэлементов у женщин при беременности и в период грудного вскармливания.

Противопоказания:

— мочекаменная болезнь;

— гиперкальциемия;

— гиперкальциурия;

— повышенная чувствительность к компонентам препарата.

Способ применения и дозы:

Взрослым и детям старше 12 лет назначают по 1 таб. 2 раза/сут во время приема пищи.

Детям в возрасте от 5 до 12 лет назначают по 1 таб. 1 раз/сут во время приема пищи.

С *20-й недели беременности и в течение всего периода грудного вскармливания* назначают по 1 таб. 2 раза/сут.

При *дефиците кальция и микроэлементов* назначают по 1 таб./сут.

Побочное действие:

Со стороны пищеварительной системы: тошнота, рвота, метеоризм.

Со стороны обмена веществ: гиперкальциемия и гиперкальциурия.

Прочие: аллергические реакции.

Передозировка:

Симптомы: запоры, тошнота, рвота; возможно также развитие гиперкальциемии и гиперкальциурии, приводящие к накоплению кальция в мягких тканях и необратимым изменениям в почках и сердечно-сосудистой системе.

Применение при беременности и кормлении грудью:

Возможно назначение препарата Кальцемин при беременности и в период лактации по показаниям.

При применении в период грудного вскармливания следует учитывать, что колекальциферол и его метаболиты выделяются с грудным молоком.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Данные о лекарственном взаимодействии препарата Кальцемин не предоставлены.

Особые указания и меры предосторожности:

При применении препарата не следует превышать рекомендованные дозы, т.к. повышенное потребление кальция может угнетать всасывание в кишечнике железа, цинка и других необходимых минералов.

При нарушениях функции почек

Противопоказано применение препарата при мочекаменной болезни, гиперкальциурии.

Применение в детском возрасте

Препарат назначают детям старше 5 лет.

Условия хранения:

Препарат следует хранить в сухом, недоступном для детей месте при температуре от 15° до 30°С. Срок годности – 3 года.

Условия отпуска в аптеке:

Без рецепта.

Источник: http://drugs.thead.ru/Kalcemin