Кальцемин Адванс



Код АТХ:

- A12AX

Полезные ссылки:

Цена в Яндексе Горздрав Столички Апрель
Госреестр Википедия Реестр ЕАЭС
РЛС VIDAL Mail.Ru Drugs.com[англ]

Форма выпуска:

◊ ***Таблетки, покрытые оболочкой*** розового цвета, вытянутой капсуловидной формы, с выдавленной на одной из сторон насечкой.

	1 таб.
кальций (в форме цитрата и карбоната)	500 мг
колекальциферол (вит. D_3)	200 МЕ
магний (в форме оксида)	40 мг
медь (в форме оксида)	1 мг
цинк (в форме оксида)	7.5 мг
марганец (в форме сульфата)	1.8 мг
бор (в форме натрия бората)	250 мкг

Вспомогательные вещества: мальтодекстрин - 62.66 мг, целлюлоза микрокристаллическая - 50 мг, кроскармеллоза натрия - 38 мг, акация - 37.96 мг, стеариновая кислота - 16.33 мг, полисахарид сои - 15 мг, титана диоксид - 8.55 мг, натрия лаурилсульфат - 5 мг.

Состав оболочки: гипромеллоза (гидроксипропилметилцеллюлоза) - 17.47 мг, магния силикат - 5 мг, триацетин - 3.85 мг, масло минеральное - 1.92 мг, FD&C красный №40 лак - 210 мкг, FD&C желтый №6 лак - 53 мкг, FD&C синий №1 лак - 27 мкг.

30 шт. - флаконы полиэтиленовые (1) - пачки картонные.
60 шт. - флаконы полиэтиленовые (1) - пачки картонные.
120 шт. - флаконы полиэтиленовые (1) - пачки картонные.

Фармакотерапевтическая группа:

- Метаболики

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Комбинированный препарат. Регулирует фосфорно-кальциевый обмен. Восполняет дефицит кальция, витамина D_3, магния, микроэлементов. Способствует укреплению костей и суставов, предупреждает заболевания опорно-двигательного аппарата.

Фармакокинетика

Данные о фармакокинетике препарата Кальцемин Адванс не предоставлены.

Показания к применению:

Профилактика и комплексное лечение остеопороза различного генеза:

— у женщин в период менопаузы (естественной и хирургической);

— у лиц, длительно принимающих ГКС и иммунодепрессанты.

Терапия заболеваний опорно-двигательного аппарата:

— для улучшения консолидации травматических переломов.

Для восполнения дефицита кальция и микроэлементов у подростков.

Относится к болезням:

- Остеопороз
- Травмы

Противопоказания:

— мочекаменная болезнь;

— гиперкальциемия;

— гиперкальциурия;

— детский возраст до 12 лет;

— повышенная чувствительность к компонентам препарата.

Способ применения и дозы:

Взрослым и детям (старше 12 лет) - по 1 таб. 2 раза/сут. Препарат назначают внутрь во время еды.

Побочное действие:

Со стороны пищеварительной системы: тошнота, рвота, метеоризм.

Со стороны обмена веществ: гиперкальциемия и гиперкальциурия.

Прочие: аллергические реакции.

Передозировка:

Симптомы: запор, тошнота и рвота, гиперкальциемия и гиперкальциурия.

Лечение: отмена препарата, проведение симптоматической терапии.

Применение при беременности и кормлении грудью:

Необходимость применения препарата при беременности и в период лактации (грудного вскармливания) врач решает индивидуально.

Следует учитывать, что колекальциферол (вит. D_3) и его метаболиты выделяются с грудным молоком. При дефиците кальция и минеральных солей рекомендуемая доза - 1 таб./сут.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Данные о лекарственном взаимодействии препарата Кальцемин Адванс не предоставлены.

Особые указания и меры предосторожности:

Не следует превышать рекомендуемую дозу, т.к. повышенное потребление кальция может угнетать всасывание в кишечнике железа, цинка и других необходимых минералов.

Применение в детском возрасте

Применение препарата противопоказано в детском возрасте до 12 лет.

Условия хранения:

Препарат следует хранить в недоступном для детей, сухом месте при температуре от 15° до 30°С. Срок годности – 3 года.

Условия отпуска в аптеке:

Без рецепта.

Источник: http://drugs.thead.ru/Kalcemin_Advans