Кальцинова



Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- Поливитамин
- Мультиминерал

Полезные ссылки:

Цена в Яндексе Горздрав Столички Апрель
Госреестр[МНН] [МНН] Википедия[МНН] [МНН] Реестр ЕАЭС
РЛС VIDAL Mail.Ru Drugs.com[англ]

Форма выпуска:

◊ ***Таблетки фруктовые*** круглые, с незначительной мраморностью, розового цвета (малиновые), или светло-желтого цвета (ананасовые), или светло-голубого цвета (черничные), или светло-зеленого цвета (киви).

	1 таб.
ретинола пальмитат (вит. А)	2 мг (1000 МЕ)
колекальциферол (вит. D_3)	1 мг (100 МЕ)
аскорбиновая кислота (вит. С)	15 мг
пиридоксина гидрохлорид (вит. B_6)	400 мкг
кальция гидрофосфата дигидрат	430.4 мг
что соответствует содержанию	
Ca^{2+}	100 мг
P^{5+}	77 мг

Вспомогательные вещества: крахмал кукурузный, повидон, лимонная кислота безводная, полисорбат 80, магния стеарат.

1 таблетка светло-зеленого цвета (киви) дополнительно содержит: краситель зеленый (краситель хинолиновый желтый (Е104), индигокармин (Е132)), ароматизатор киви, сахароза.
1 таблетка светло-голубого цвета (черничные) дополнительно содержит: краситель индигокармин (Е132), ароматизатор черничный, сахароза.
1 таблетка светло-желтого цвета (ананасовые) дополнительно содержит: краситель хинолиновый желтый 06121 (Е104), ароматизатор ананасовый,сахароза.
1 таблетка розового цвета (малиновые) дополнительно содержит: краситель красный очаровательный (Е129), ароматизатор малиновый, сахароза.

9 шт. - блистеры (3) - коробки картонные.

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Комбинированный препарат, содержащий комплекс витаминов и минералов, являющихся важными факторами метаболических процессов.

Кальций участвует в формировании костной ткани, свертывании крови, передаче нервных импульсов, сокращении скелетных и гладких мышц, нормальной работе сердца.

Фосфор наряду с кальцием участвует в формировании костей и зубов, а также участвует в процессах энергетического обмена.

Для правильной минерализации костей и зубов кроме кальция и фосфора, являющихся строительным материалом, необходимо употреблять витамины, особенно витамин D_3 (колекальциферол), способствующий абсорбции кальция и фосфора в органах пищеварения и их правильному распределению в костной и зубной тканях.

Витамин А (ретинол) участвует в синтезе различных веществ (белков, липидов, мукополисахаридов) и обеспечивает нормальную функцию кожи, слизистых оболочек, а также органа зрения.

Витамин B_6 (пиридоксин) способствует поддержанию структуры и функции костей, зубов, десен; оказывает влияние на эритропоэз, способствует нормальному функционированию нервной системы.

Витамин С (аскорбиновая кислота) участвует в окислении ряда биологически активных веществ, регуляции обмена в соединительной ткани, углеводного обмена, свертываемости крови и регенерации тканей, стимулирует образование стероидных гормонов, нормализует проницаемость капилляров. Витамин С повышает устойчивость организма к инфекциям, снижает воспалительные реакции.

Фармакокинетика

Данные о фармакокинетике препарата Кальцинова не предоставлены.

Показания к применению:

Препарат Кальцинова рекомендуются детям:

— в период интенсивного роста и развития;

— при непереносимости молока и молочных продуктов;

— для укрепления и защиты костей и зубов.

Противопоказания:

— гипервитаминоз;

— гиперкальциурия;

— гиперкальциемия;

— почечная недостаточность тяжелой степени (КК менее 30 мл/мин);

— детский возраст до 3-х лет;

— повышенная чувствительность к компонентам препарата.

С *осторожностью* следует применять препарат при сахарном диабете.

Способ применения и дозы:

Детям в возрасте от 3 до 4 лет препарат назначают по 2-3 таб./сут, **детям в возрасте 4 лет и старше** - по 4-5 таб./сут.

Таблетки следует разжевывать или держать во рту до полного растворения.

Побочное действие:

Возможны аллергические реакции, диарея и боль в животе. В этом случае необходимо прервать лечение препаратом Кальцинова и проконсультироваться с лечащим врачом.

Передозировка:

Длительный прием препарата в высоких дозах может привести к развитию гипервитаминоза A и D, а также гиперкальциемии, гиперкальциурии.

Лечение: проводят симптоматическую терапию.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Препарат Кальцинова нельзя принимать одновременно с препаратами тетрациклинового ряда и натрия фторидом, т.к. кальций снижает абсорбцию этих препаратов. Если необходимо применение данной комбинации, интервал между приемами этих препаратов должен составлять не менее 3 ч.

Пиридоксин угнетает активность леводопы.

Особые указания и меры предосторожности:

Не рекомендуется назначать препарат Кальцинова при сахарном диабете, т.к. в состав таблеток входит сахароза.

Влияние на способность к вождению автотранспорта и управлению механизмами

Не известно отрицательного влияния на способность управления автомобилем и работе с другими механизмами.

При нарушениях функции почек

Противопоказан при почечной недостаточности тяжелой степени.

Применение в детском возрасте

Противопоказание: детский возраст до 3-х лет.

Условия хранения:

Препарат следует хранить в защищенном от света, недоступном для детей месте при температуре не выше 25°С.

Срок годности:

2 года.

Условия отпуска в аптеке:

Без рецепта.

Источник: http://drugs.thead.ru/Kalcinova