# Кальций+Витамин С



## Полезные ссылки:

Цена в Яндексе Горздрав Столички Апрель
Госреестр Википедия Реестр ЕАЭС
РЛС VIDAL Mail.Ru Drugs.com[англ]

## Форма выпуска:

| ◊ ***Таблетки шипучие*** | **1 таб.** |
|---|---|
| кальция карбонат | 500 мг |
| аскорбиновая кислота | 180 мг |

12 шт. - пеналы пластиковые.

## Фармакологические свойства:

***Фармакодинамика***

Препарат регулирует кальциево-фосфорный обмен и является источником витамина С.

## Показания к применению:

— дефицит кальция;

— профилактика гиповитаминоза витамина С;

— повышенные умственные и физические нагрузки;

— беременность и период лактации;

— астенические состояния;

— вяло заживающие раны;

— переломы костей;

— комплексная терапия аллергических заболеваний.

## Относится к болезням:

- Аллергия
- Астенические состояния
- Астения

- Раны

## Противопоказания:

— повышенная чувствительность к компонентам препарата;

— повышенная концентрация кальция в крови и моче(гиперкальциемия, гиперкальциурия);

— хроническая почечная недостаточность;

— нефроуролитиаз;

— нефрокальциноз.

## Способ применения и дозы:

Внутрь. Перед приемом таблетку растворяют в стакане воды.

**Взрослым** - 1-2 таб./сут.

## Побочное действие:

В *редких случаях* могут возникать слабо выраженные нарушения со стороны ЖКТ (метеоризм, запор или диарея); аллергические реакции, одышка, жар.

При *приеме в высоких дозах* - головная боль, повышенная утомляемость, жажда, полиурия.

## Передозировка:

О случаях острой передозировки не сообщалось. Возможны нарушения со стороны ЖКТ, что не приведет к возникновению гиперкальциемии, за исключением случаев одновременного назначения высоких доз витамина Д и его производных.

*Лечение:* симптоматическое.

## Применение при беременности и кормлении грудью:

Кальций проникает в грудное молоко. В период беременности суточная доза кальция не должна превышать 1500 мг. Гиперкальциемия в период беременности может вызвать дефекты физического и умственного развития у плода.

## Особые указания и меры предосторожности:

***При нарушениях функции почек***

Противопоказано: хроническая почечная недостаточность.

## Условия хранения:

Хранить в сухом, защищенном от света месте при температуре не выше 25°С. Хранить в недоступном для детей месте.

Не использовать после даты, указанной на упаковке.

## Срок годности:

3 года.

## Условия отпуска в аптеке:

Без рецепта.

**Источник:** http://drugs.thead.ru/KalciyVitamin_S