Кальций+Витамин С



Полезные ссылки:

Цена в Яндексе Горздрав Столички Апрель Госреестр Википедия PЛС VIDAL Mail.Ru Drugs.com^{англ}

Форма выпуска:

◊ Таблетки шипучие	1 таб.
кальция карбонат	500 мг
аскорбиновая кислота	180 мг

¹² шт. - пеналы пластиковые.

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Препарат регулирует кальциево-фосфорный обмен и является источником витамина С.

Показания к применению:

- дефицит кальция;
- профилактика гиповитаминоза витамина С;
- повышенные умственные и физические нагрузки;
- беременность и период лактации;
- астенические состояния;
- вяло заживающие раны;
- переломы костей;
- комплексная терапия аллергических заболеваний.

Относится к болезням:

- Аллергия
- Астенические состояния
- Астения

Раны

Противопоказания:

- повышенная чувствительность к компонентам препарата;
- повышенная концентрация кальция в крови и моче(гиперкальциемия, гиперкальциурия);
- хроническая почечная недостаточность;
- нефроуролитиаз;
- нефрокальциноз.

Способ применения и дозы:

Внутрь. Перед приемом таблетку растворяют в стакане воды.

Взрослым - 1-2 таб./сут.

Побочное действие:

В *редких случаях* могут возникать слабо выраженные нарушения со стороны ЖКТ (метеоризм, запор или диарея); аллергические реакции, одышка, жар.

При приеме в высоких дозах - головная боль, повышенная утомляемость, жажда, полиурия.

Передозировка:

О случаях острой передозировки не сообщалось. Возможны нарушения со стороны ЖКТ, что не приведет к возникновению гиперкальциемии, за исключением случаев одновременного назначения высоких доз витамина Д и его производных.

Лечение: симптоматическое.

Применение при беременности и кормлении грудью:

Кальций проникает в грудное молоко. В период беременности суточная доза кальция не должна превышать 1500 мг. Гиперкальциемия в период беременности может вызвать дефекты физического и умственного развития у плода.

Особые указания и меры предосторожности:

При нарушениях функции почек

Противопоказано: хроническая почечная недостаточность.

Условия хранения:

Хранить в сухом, защищенном от света месте при температуре не выше 25°C. Хранить в недоступном для детей месте.

Не использовать после даты, указанной на упаковке.

Срок годности:

3 года.

Условия отпуска в аптеке:

Без рецепта.

Источник: http://drugs.thead.ru/KalciyVitamin_S