

## [Кальций+Витамин С](#)



### Полезные ссылки:

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#) [Апрель](#)  
[Госреестр](#) [Википедия](#)  
[РЛС VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)<sup>англ</sup>

### Форма выпуска:

↙ <b>Таблетки шипучие</b>	<b>1 таб.</b>
кальция карбонат	500 мг
аскорбиновая кислота	180 мг

12 шт. - пеналы пластиковые.

### Фармакологические свойства:

#### **Фармакодинамика**

Препарат регулирует кальциево-фосфорный обмен и является источником витамина С.

### Показания к применению:

- дефицит кальция;
- профилактика гиповитаминоза витамина С;
- повышенные умственные и физические нагрузки;
- беременность и период лактации;
- астенические состояния;
- вяло заживающие раны;
- переломы костей;
- комплексная терапия аллергических заболеваний.

### Относится к болезням:

- [Аллергия](#)
- [Астенические состояния](#)
- [Астения](#)

- [Раны](#)

## Противопоказания:

- повышенная чувствительность к компонентам препарата;
- повышенная концентрация кальция в крови и моче(гиперкальциемия, гиперкальциурия);
- хроническая почечная недостаточность;
- нефроуролитиаз;
- нефрокальциноз.

## Способ применения и дозы:

Внутрь. Перед приемом таблетку растворяют в стакане воды.

**Взрослым** - 1-2 таб./сут.

## Побочное действие:

В *редких случаях* могут возникать слабо выраженные нарушения со стороны ЖКТ (метеоризм, запор или диарея); аллергические реакции, одышка, жар.

При приеме в *высоких дозах* - головная боль, повышенная утомляемость, жажда, полиурия.

## Передозировка:

О случаях острой передозировки не сообщалось. Возможны нарушения со стороны ЖКТ, что не приведет к возникновению гиперкальциемии, за исключением случаев одновременного назначения высоких доз витамина Д и его производных.

*Лечение:* симптоматическое.

## Применение при беременности и кормлении грудью:

Кальций проникает в грудное молоко. В период беременности суточная доза кальция не должна превышать 1500 мг. Гиперкальциемия в период беременности может вызвать дефекты физического и умственного развития у плода.

## Особые указания и меры предосторожности:

### **При нарушениях функции почек**

Противопоказано: хроническая почечная недостаточность.

## Условия хранения:

Хранить в сухом, защищенном от света месте при температуре не выше 25°C. Хранить в недоступном для детей месте.

Не использовать после даты, указанной на упаковке.

## Срок годности:

3 года.

**Условия отпуска в аптеке:**

Без рецепта.

**Источник:** [http://drugs.thead.ru/KalcijVitamin\\_S](http://drugs.thead.ru/KalcijVitamin_S)