Кальция Добезилат



Полезные ссылки:

Цена в Яндексе Горздрав Столички Апрель Госреестр Википедия РЛС VIDAL Mail.Ru Drugs.com^{англ}

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Ангиопротектор. Нормализует повышенную проницаемость сосудистой стенки, увеличивает резистентность капилляров и улучшает микроциркуляцию при различных сосудистых и обменных заболеваниях. Несколько уменьшает агрегацию тромбоцитов, снижает вязкость крови.

Фармакокинетика

Относительно медленно адсорбируется из ЖКТ. C_{max} в плазме после приема внутрь достигается через 5-6 ч. Связывание с белками плазмы составляет 20-25%. Не проникает через ГЭБ. Выводится преимущественно почками в течение 24 ч и кишечником. $T_{1/2}$ – 5 ч.

Показания к применению:

Сосудистые поражения с повышенной хрупкостью и проницаемостью капилляров (диабетическая ретинопатия, микроангиопатия) и другие нарушения, связанные с различными сердечно-сосудистыми и обменными заболеваниями, венозная недостаточность различной степени выраженности и ее последствия.

Относится к болезням:

- Венозная недостаточность
- Диабетическая ретинопатия
- Ретинопатия

Противопоказания:

Геморрагии, вызванные антикоагулянтами, I триместр беременности, гиперчувствительность, язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки (в фазе обострения), кровотечение из ЖКТ, заболевания почек и печени, детский возраст до 13 лет.

Способ применения и дозы:

При приеме внутрь - по 250 мг 3 раза/сут или по 500 мг 1-2 раза/сут во время еды в течение 2-3 недель, затем

снижают дозу до 250-500 мг/сут. При лечении ретинопатии и микроангиопатии - по 250 мг 2-3 раза/сут в течение 4-6 месяцев, затем 250-500 мг/сут.

Побочное действие:

Редко: желудочно-кишечные нарушения (тошнота, рвота, диарея, гастралгия), повышение активности печеночных трансаминаз, аллергический дерматоз, лихорадочные реакции, головная боль, головокружение.

Применение при беременности и кормлении грудью:

Противопоказан в І триместре беременности.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Усиливает действие непрямых антикоагулянтов, гепарина, ГКС, гипогликемическое действие производных сульфонилмочевины.

Не рекомендуется сочетать кальция добезилат с препаратами лития и метотрексатом.

При одновременном применении повышает антиагрегантную активность тиклопидина.

Особые указания и меры предосторожности:

Кальция добезилат можно применять профилактически.

При нарушениях функции почек

Противопоказан при заболеваниях почек.

При нарушениях функции печени

Противопоказан при заболеваниях печени.

Применение в детском возрасте

Противопоказан в детском возрасте до 13 лет.

Источник: http://drugs.thead.ru/Kalciya_Dobezilat