

## Календулы настойка



### **Международное непатентованное название (Действующее вещество):**

- [Календулы лекарственной цветки](#)

### **Полезные ссылки:**

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#)  
[Госреестр](#)<sup>МНН</sup> [Википедия](#)<sup>МНН</sup>  
[РЛС VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)<sup>англ</sup>

### **Форма выпуска:**

♦ <b>Настойка</b>	<b>1 фл.</b>
настойка цветков календулы (100 г растительного сырья на 1 л настойки)	50 мл

*Экстрагент:* этанол 70%.

25 мл - флаконы темного стекла (1) - пачки картонные.  
40 мл - флаконы темного стекла (1) - пачки картонные.  
50 мл - флаконы темного стекла (1) - пачки картонные.  
100 мл - флаконы темного стекла (1) - пачки картонные.

### **Фармакотерапевтическая группа:**

- [Ненаркотические анальгетики, включая нестероидные и другие противовоспалительные средства](#)

### **Фармакологические свойства:**

#### **Фармакодинамика**

Настойка календулы оказывает антисептическое, желчегонное, спазмолитическое и местное противовоспалительное действие.

### **Показания к применению:**

Применяют наружно как антисептическое и противовоспалительное средство при порезах, ушибах, экземах; местно - для полоскания при воспалительных заболеваниях горла (тонзиллит, фарингит, ларингит) и слизистой оболочки полости рта (стоматит, гингивит, пародонтит).

Внутри настойку календулы применяют при холецистите, холангите.

## **Относится к болезням:**

- [Гингивит](#)
- [Ларингит](#)
- [Пародонтит](#)
- [Порезы](#)
- [Стоматит](#)
- [Тонзиллит](#)
- [Ушиб](#)
- [Фарингит](#)
- [Холангит](#)
- [Холера](#)
- [Холецистит](#)
- [Экзема](#)

## **Противопоказания:**

Повышенная индивидуальная чувствительность к компонентам препарата. При применении внутрь - острый гастрит, язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки в период обострения, калькулезный холецистит, беременность, период лактации, возраст до 18 лет.

*С осторожностью.* Заболевания печени, алкоголизм, черепно-мозговая травма, заболевания головного мозга.

## **Способ применения и дозы:**

Наружно, местно, внутрь. Участки с поверхностными повреждениями кожных покровов (порезы) обрабатывают настойкой с помощью тампона. При ушибах и экземе применяют водный раствор настойки (1 чайную ложку на стакан воды) в виде примочек. Для полоскания горла и слизистой оболочки полости рта используют 1/4-1 стакан водного раствора настойки. Курс лечения - 1-2 недели.

Внутрь за 15 мин до еды применяют по 10-20 капель, разведенных в 1/4 стакана воды, 3 раза в день. Курс лечения - 3-4 недели.

## **Побочное действие:**

Возможны аллергические реакции (в т.ч. кожный зуд). При приеме внутрь - изжога, тошнота, горечь во рту, боль в животе.

## **Особые указания и меры предосторожности:**

Содержание абсолютного спирта в максимальной разовой дозе препарата составляет 0.23 г, в максимальной суточной дозе - 0.7 г.

В период применения препарата необходимо соблюдать осторожность при потенциально опасных видах деятельности, требующих особого внимания и быстрых реакций (управление автотранспортом, работа с движущимися механизмами, работа диспетчера и оператора и т.п.).

## **Условия хранения:**

В защищенном от света месте при температуре от 15 до 25°C. Хранить в недоступном для детей месте.

Не применять по истечении срока годности.

## **Срок годности:**

4 года.

## **Условия отпуска в аптеке:**

Без рецепта.

## **Календулы настойка**

Фармакологическая база данных (<http://drugs.thead.ru>)

---

**Источник:** [http://drugs.thead.ru/Kalenduly\\_nastoyka](http://drugs.thead.ru/Kalenduly_nastoyka)