Калгель



Код АТХ:

- A01AD11

Полезные ссылки:

Цена в Яндексе Горздрав Столички Апрель
Госреестр Википедия Реестр ЕАЭС
РЛС VIDAL Mail.Ru Drugs.com[англ]

Форма выпуска:

Гель стоматологический желто-коричневого цвета, мягкий, однородный, с характерным запахом, свободный от крупинок, комков и посторонних частиц.

	1 г
лидокаина гидрохлорид	3.3 мг
цетилпиридиния хлорид	1 мг

Вспомогательные вещества: сорбитола раствор 70% (некристаллизующийся) - 210 мг, ксилитол - 140 мг, этанол 96% - 93.6 мг, глицерол - 70 мг, гиэтеллоза - 25 мг, макрогола глицерилгидроксистеарат - 10 мг, лауромакрогол 600 - 3.3 мг, макрогол 300 - 3.3 мг, натрия сахаринат - 1 мг, левоментол - 0.6 мг, ароматизатор травяной 17.42.5490 - 4.8 мг, карамель (Е150) - 1 мг, натрия цитрат - 8.3 мг, лимонной кислоты моногидрат - 1.05 мг, вода - до 1000 мг.

10 г - тубы алюминиевые (1) - пачки картонные.

Фармакотерапевтическая группа:

- Органотропные средства

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Комбинированный препарат с местноанестезирующим и противомикробным действием для местного применения.

Лидокаина гидрохлорид - оказывает местноанестезирующее действие, которое обусловлено угнетением нервной

проводимости за счет блокады натриевых каналов.

Цетилпиридиния хлорид - антисептик. Подавляет рост ряда бактерий и грибов.

Фармакокинетика

Данные о фармакокинетике препарата Калгель не предоставлены.

Показания к применению:

— болевой синдром при прорезывании зубов у детей с 5-месячного возраста.

Относится к болезням:

- Болевой синдром

Противопоказания:

— почечная недостаточность;

— печеночная недостаточность;

— артериальная гипотензия;

— сердечная недостаточность II-III стадии;

— нарушение внутрижелудочковой проводимости;

— брадикардия;

— повышенная чувствительность к лидокаину, цетилпиридинию или любому другому компоненту препарата.

Способ применения и дозы:

Препарат предназначен для местного применения. Небольшое количество геля (около 7.5 мм) наносят на кончик чистого пальца и осторожно втирают в воспаленный участок десны. При необходимости гель можно наносить повторно с интервалом не менее 20 мин, но не чаще 6 раз/сут.

Побочное действие:

Возможны аллергические реакции: крапивница, зуд, анафилактический шок.

Возможно нарушение глотания.

Если во время применения геля появляются признаки аллергии, то препарат следует отменить и обратиться к врачу.

Передозировка:

Симптомы: рвота, бледность кожных покровов, брадикардия, угнетение дыхательного центра, апноэ.

Лечение: отмена препарата. Необходимо обратиться к врачу.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

В случае необходимости применения других препаратов, необходимо проконсультироваться с врачом.

Особые указания и меры предосторожности:

Перед применением препарата необходимо проконсультироваться с врачом-педиатром.

Не следует превышать рекомендованные дозы, т.к. необходимо учитывать возможность проглатывания препарата при кормлении и во время сна.

При нарушениях функции почек

Противопоказан при почечной недостаточности.

При нарушениях функции печени

Противопоказан при печеночной недостаточности.

Условия хранения:

Препарат следует хранить в недоступном для детей месте при температуре не выше 25°C.

Срок годности:

3 года.

Условия отпуска в аптеке:

По рецепту.

Источник: http://drugs.thead.ru/Kalgel