Каметон (спрей)

Код АТХ:

- R02AA20

Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- Левоментол
- Камфора
- Хлоробутанол
- Эвкалипта прутовидного листьев масло

Полезные ссылки:

Цена в Яндексе Горздрав Столички Апрель
Госреестр[МНН МНН МНН МНН] Википедия[МНН МНН МНН МНН] Реестр ЕАЭС
РЛС VIDAL Mail.Ru Drugs.com[англ]

Форма выпуска:

◊ ***Спрей для местного применения*** содержимое флакона - эмульсия белого цвета с характерным запахом; при нажатии на распылительную насадку образуется поток диспергированных в воздушной среде капель жидкости; допускается расслоение эмульсии, устраняемое при взбалтывании.

	20 г
камфора	200 мг
левоментол	200 мг
хлорбутанола гемигидрат	200 мг
масло эвкалиптовое	200 мг

Вспомогательные вещества: масло вазелиновое, эмульгатор "Твердый-2" (Т-2), полисорбат 80, вода очищенная.

20 г - флаконы с распылителем (1) - пачки картонные.
20 г - флаконы с распылителем (1) - пачки.

Фармакотерапевтическая группа:

- Нейротропные средства
- Противомикробные, противопаразитарные и противоглистные средства

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Каметон - комбинированный препарат, действие которого определяется входящими в его состав компонентами.

Хлоробутанола гемидрат оказывает легкое анестезирующее, противовоспалительное и антисептическое действие.

Камфора рацемическая оказывает раздражающее и отчасти антисептическое действие, усиливает кровоток в месте нанесения.

Левоментол оказывает местнораздражающее действие, сопровождающееся ощущением холода, легкого жжения и покалывания, оказывает местноанестезирующее действие, обладает также слабыми антисептическими свойствами.

Эвкалипта листьев масло оказывает стимулирующее влияние на рецепторы слизистых оболочек, обладает также слабой местной противоспалительной и антисептической активностью.

В связи с низкой системной абсорбцией данные о фармакокинетике препарата отсутствуют.

Показания к применению:

Воспалительные заболевания ЛОР-органов преимущественно в фазе обострения (ринит, тонзиллит, фарингит, ларингит и др.).

Относится к болезням:

- Ларингит
- Ринит
- Тонзиллит

Противопоказания:

Повышенная чувствительность к компонентам препарата. Детский возраст (до 5 лет).

Способ применения и дозы:

Местно.

Каметон спрей распыляют в полости рта или носа на фазе вдоха. Перед применением направляющую трубку устанавливают под углом 90° к флакону для орошения полости рта или под любым удобным углом для орошения полости носа. Конец направляющей трубки вводят в полость рта либо носа (в полость носа на глубину 0.5 см) и нажимают на распылительную насадку.

За один сеанс ингаляции проводят 2-3 распыления. Частота ингаляций обычно составляет 3-4 раза в сут.

Побочное действие:

Возможна индивидуальная непереносимость, аллергические реакции в виде кожной сыпи.

Применение при беременности и кормлении грудью:

Достаточного опыта по применению препарата во время беременности и кормления грудью нет. Возможно применение, если отсутствуют побочные явления.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Системные эффекты при использовании препарата по назначению практически исключены, что позволяет параллельно применять другие лекарственные средства без опасности их взаимодействия с компонентами препарата.

Особые указания и меры предосторожности:

Применение в детском возрасте

Противопоказан детям до 5 лет.

Условия хранения:

При температуре от 0°C до 25°C в защищенном от света месте. Не допускать замораживания. Хранить в недоступном для детей месте.

Не применять по истечении срока годности.

Срок годности:

2 года.

Условия отпуска в аптеке:

Без рецепта.

Источник: http://drugs.thead.ru/Kameton_sprey