

Каметон (спрей)



Код АТХ:

- [R02AA20](#)

Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- [Левоментол](#)
- [Камфора](#)
- [Хлоробутанол](#)
- [Эвкалипта прутовидного листьев масло](#)

Полезные ссылки:

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#) [Апрель](#)
[Госреестр](#)^{МНН МНН МНН МНН} [Википедия](#)^{МНН МНН МНН МНН}
[РЛС VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)^{англ}

Форма выпуска:

♦ **Спрей для местного применения** содержимое флакона - эмульсия белого цвета с характерным запахом; при нажатии на распылительную насадку образуется поток диспергированных в воздушной среде капель жидкости; допускается расслоение эмульсии, устраняемое при взбалтывании.

	20 г
камфора	200 мг
левоментол	200 мг
хлорбутанола гемигидрат	200 мг
масло эвкалиптовое	200 мг

Вспомогательные вещества: масло вазелиновое, эмульгатор "Твердый-2" (Т-2), полисорбат 80, вода очищенная.

20 г - флаконы с распылителем (1) - пачки картонные.

20 г - флаконы с распылителем (1) - пачки.

Фармакотерапевтическая группа:

- [Нейротропные средства](#)
- [Противомикробные, противопаразитарные и противоглистные средства](#)

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Каметон - комбинированный препарат, действие которого определяется входящими в его состав компонентами.

Хлоробутанола гемигидрат оказывает легкое анестезирующее, противовоспалительное и антисептическое действие.

Камфора рацемическая оказывает раздражающее и отчасти антисептическое действие, усиливает кровоток в месте нанесения.

Левоментол оказывает местнораздражающее действие, сопровождающееся ощущением холода, легкого жжения и покалывания, оказывает местноанестезирующее действие, обладает также слабыми антисептическими свойствами.

Эвкалипта листьев масло оказывает стимулирующее влияние на рецепторы слизистых оболочек, обладает также слабой местной противовоспалительной и антисептической активностью.

В связи с низкой системной абсорбцией данные о фармакокинетике препарата отсутствуют.

Показания к применению:

Воспалительные заболевания ЛОР-органов преимущественно в фазе обострения (ринит, тонзиллит, фарингит, ларингит и др.).

Относится к болезням:

- [Ларингит](#)
- [Ринит](#)
- [Тонзиллит](#)

Противопоказания:

Повышенная чувствительность к компонентам препарата. Детский возраст (до 5 лет).

Способ применения и дозы:

Местно.

Каметон спрей распыляют в полости рта или носа на фазе вдоха. Перед применением направляющую трубку устанавливают под углом 90° к флакону для орошения полости рта или под любым удобным углом для орошения полости носа. Конец направляющей трубки вводят в полость рта либо носа (в полость носа на глубину 0.5 см) и нажимают на распылительную насадку.

За один сеанс ингаляции проводят 2-3 распыления. Частота ингаляций обычно составляет 3-4 раза в сут.

Побочное действие:

Возможна индивидуальная непереносимость, аллергические реакции в виде кожной сыпи.

Применение при беременности и кормлении грудью:

Достаточного опыта по применению препарата во время беременности и кормления грудью нет. Возможно применение, если отсутствуют побочные явления.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Системные эффекты при использовании препарата по назначению практически исключены, что позволяет параллельно применять другие лекарственные средства без опасности их взаимодействия с компонентами препарата.

Особые указания и меры предосторожности:

Применение в детском возрасте

Противопоказан детям до 5 лет.

Условия хранения:

При температуре от 0°C до 25°C в защищенном от света месте. Не допускать замораживания. Хранить в недоступном для детей месте.

Не применять по истечении срока годности.

Срок годности:

2 года.

Условия отпуска в аптеке:

Без рецепта.

Источник: http://drugs.thead.ru/Kameton_sprey