Камфорная Мазь

Полезные ссылки:

Цена в Яндексе Горздрав Столички Апрель
Госреестр Википедия
РЛС VIDAL Mail.Ru Drugs.com[англ]

Форма выпуска:

◊ ***Мазь для наружного применения***	**100 г**
камфора	10 г

Вспомогательные вещества: вазелин 54 г, парафин твердый нефтяной 8 г, ланолин безводный 28 г.

25 г - банки оранжевого стекла (1) - пачки картонные.
50 г - банки оранжевого стекла (1) - пачки картонные.
30 г - тубы алюминиевые (1) - пачки картонные.
40 г - тубы алюминиевые (1) - пачки картонные.

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Препарат природного происхождения оказывает антисептическое, местнораздражающее, местное, анальгезирующее, и противовоспалительное действия. Возбуждая чувствительные нервные окончания кожи, расширяет кровеносные сосуды и улучшает трофику органов й тканей.

Фармакокинетика

При нанесении на поверхность кожи частично всасывается, подвергается окислению. Продукты окисления соединяются с глюкуроновой кислотой и выводятся почками. Часть камфоры выделяется в неизмененном виде легкими и с желчью. Проницаемость через ГЭБ и плацентарный барьер — высокая; секреция с материнским молоком — высокая.

Показания к применению:

— миалгия;

— миозит;

— артралгия;

— ишиас;

— профилактика образования пролежней.

Относится к болезням:

- Артралгия
- Артрит
- Артроз
- Ишиас
- Миалгия
- Пролежни

Противопоказания:

— нарушение целостности кожных покровов или воспалительные заболевания кожи в месте предполагаемого нанесения (в т.ч.
дерматит,экзема);

— беременность;

— период лактации;

— возраст до 18 лет (в связи с отсутствием данных);

— повышенная чувствительность.

Способ применения и дозы:

Наружно. Небольшое количество мази наносят на область болевых ощущений и легкими движениями растирают 2-3 раза/сут.

Профилактика образования пролежней: обработка кожных покровов 2-3 раза/сут. После применения мази тщательно вымыть руки. Курс лечения - 7-10 дней. Проведение повторных курсов лечения возможно по рекомендации врача.

Побочное действие:

Аллергические кожные реакции (крапивница), раздражение кожи, головная боль, головокружение.

Передозировка:

До настоящего времени о случаях передозировки,при применении препарата не сообщалось.

Применение при беременности и кормлении грудью:

Противопоказан при беременности и в период лактации.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Не выявлено.

Особые указания и меры предосторожности:

Следует избегать попадания препарата на открытые раны, в глаза и в слизистые оболочки.

Влияние на способность к вождению автотранспорта и управлению механизмами

В период лечения необходимо соблюдать осторожность при управлении автотранспортными средствами и занятии другими потенциально опасными видами деятельности, требующими повышенной концентрации внимания и быстроты, психомоторных реакций

Применение в детском возрасте

Противопоказан детям до 18 лет.

Условия хранения:

Хранить при температуре от 12° до 15°С, в защищенном от света месте.

Не использовать по истечении срока годности, указанного на упаковке.

Срок годности:

4 года.

Условия отпуска в аптеке:

Без рецепта.

Источник: http://drugs.thead.ru/Kamfornaya_Maz