

## Камфорное Масло



### **Код АТХ:**

- [M02AX10](#)

### **Международное непатентованное название (Действующее вещество):**

- [Камфора](#)

### **Полезные ссылки:**

[Цена в Яндексе](#) [Горздрав](#) [Столички](#) [Апрель](#)

[Госреестр<sup>МНН</sup>](#) [Википедия<sup>МНН</sup>](#)

[PLC VIDAL](#) [Mail.Ru Drugs.com<sup>англ</sup>](#)

### **Фармакотерапевтическая группа:**

- [Нейротропные средства](#)
- [Противомикробные, противопаразитарные и противоглистные средства](#)

### **Фармакологические свойства:**

#### **Фармакодинамика**

Средство растительного происхождения. При наружном применении оказывает противомикробное, местнораздражающее, анальгезирующее и противовоспалительное действие; при парентеральном введении - аналептическое, кардиотоническое, вазоконстрикторное и отхаркивающее действие. Возбуждая чувствительные нервные окончания кожи, рефлекторно улучшает трофику органов и тканей.

При п/к введении стимулирует дыхательный и сосудов двигателный центры продолговатого мозга. Усиливает обменные процессы в миокарде, повышая его чувствительность к влиянию симпатических нервов. Повышает тонус венозных сосудов, увеличивает приток крови к сердцу, коронарный кровоток, кровоснабжение мозга и легких. Выделяясь из организма через дыхательные пути, способствует отделению мокроты.

#### **Фармакокинетика**

После п/к введения камфора хорошо проникает через ГЭБ и плацентарный барьер, выделяется с грудным молоком.

Выделяется почками (70%), а также через легкие (20%) и с желчью (10%).

### **Показания к применению:**

Наружно: миозиты, невралгии, профилактика пролежней.

П/к: сердечная недостаточность, коллапс, угнетение дыхательного центра при инфекционных заболеваниях (в т.ч. при пневмонии), при отравлении снотворными средствами и опиоидными анальгетиками.

**Относится к болезням:**

- [Инфекции](#)
- [Невралгия](#)
- [Неврит](#)
- [Пневмония](#)
- [Пролежни](#)

**Противопоказания:**

Повышенная чувствительность к камфоре. Эпилепсия (для п/к введения). Нарушение целостности кожных покровов (для наружного применения).

**Способ применения и дозы:**

Индивидуальный, в зависимости от показаний и применяемой лекарственной формы.

**Побочное действие:**

При наружном применении: кожные аллергические реакции, раздражение кожи.

При п/к введении: головная боль, головокружение, олеогранулема (в месте инъекции), жировая эмболия (при попадании в сосуд).

**Применение при беременности и кормлении грудью:**

Учитывая высокую проницаемость камфоры через ГЭБ, плацентарный барьер и в грудное молоко, применение камфоры при беременности и в период лактации (грудного вскармливания) необходимо проводить с осторожностью.

**Особые указания и меры предосторожности:**

С осторожностью следует применять у детей.

**Применение в детском возрасте**

С осторожностью следует применять у детей.

**Источник:** [http://drugs.thead.ru/Kamfornoe\\_Maslo](http://drugs.thead.ru/Kamfornoe_Maslo)