# Камфоры Раствор Для Инъекций В Оливковом Масле 20%



## Полезные ссылки:

Цена в Яндексе Горздрав Столички Апрель
Госреестр Википедия Реестр ЕАЭС
РЛС VIDAL Mail.Ru Drugs.com[англ]

## Фармакологические свойства:

***Фармакодинамика***

Лекарственное средство растительного происхождения. Оказывает аналептическое, кардиотоническое, вазоконстрикторное и отхаркивающее действие.

Стимулирует дыхательный и сосудодвигательный центры продолговатого мозга. Усиливает обменные процессы в миокарде, повышая его чувствительность к влиянию симпатических нервов. Повышает тонус венозных сосудов, увеличивает приток крови к сердцу, коронарный кровоток, кровоснабжение мозга и легких. Подавляет агрегацию тромбоцитов. Выделяясь через дыхательные пути, способствует отделению мокроты.

***Фармакокинетика***

Проницаемость через ГЭБ и плацентарный барьер - высокая; секреция с материнским молоком - высокая.

Выводится почками - 70%, через легкие - 20%, с желчью - 10%.

## Показания к применению:

— хроническая сердечная недостаточность;

— коллапс;

— угнетение дыхательного центра при пневмонии и других инфекционных заболеваниях, при отравлении снотворными лекарственными средствами и наркотическими анальгетиками.

## Относится к болезням:

- Инфекции
- Пневмония

## Противопоказания:

— гиперчувствительность;

— эпилепсия.

*С осторожностью:* беременность, период лактации, детский возраст.

## Способ применения и дозы:

П/к, **взрослым** - по 1-2 мл каждые 2-3 ч или по 4-5 мл 1-2 раза/сут.

**Детям: до 1 года** - 0.5-1 мл, **от 1 года до 2 лет** - 1 мл, **3-6 лет** - 1.5 мл, **7-9 лет** - 2 мл, **10-14 лет** - 2.5 мл. Вводят 1-3 раза/сут.

Перед введением рекомендуется подогреть раствор до температуры тела.

## Побочное действие:

Головная боль, головокружение, олеогранулема (в месте инъекции), жировая эмболия (при попадании в сосуд).

## Передозировка:

*Симптомы:* гиперемия кожи лица, двигательное возбуждение, бред, эпилептиформные судороги.

## Применение при беременности и кормлении грудью:

*С осторожностью:* беременность, период лактации.

## Особые указания и меры предосторожности:

***Применение в детском возрасте***

**Детям: до 1 года** - 0.5-1 мл, **от 1 года до 2 лет** - 1 мл, **3-6 лет** - 1.5 мл, **7-9 лет** - 2 мл, **10-14 лет** - 2.5 мл. Вводят 1-3 раза/сут.

## Условия отпуска в аптеке:

По рецепту.

**Источник:** http://drugs.thead.ru/Kamfory_Rastvor_Dlya_Inekciy_V_Olivkovom_Masle_20