Камфоры Раствор Для Инъекций В Оливковом Масле 20%



Полезные ссылки:

Цена в Яндексе Горздрав Столички Апрель Госреестр Википедия PЛС VIDAL Mail.Ru Drugs.com^{англ}

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Лекарственное средство растительного происхождения. Оказывает аналептическое, кардиотоническое, вазоконстрикторное и отхаркивающее действие.

Стимулирует дыхательный и сосудодвигательный центры продолговатого мозга. Усиливает обменные процессы в миокарде, повышая его чувствительность к влиянию симпатических нервов. Повышает тонус венозных сосудов, увеличивает приток крови к сердцу, коронарный кровоток, кровоснабжение мозга и легких. Подавляет агрегацию тромбоцитов. Выделяясь через дыхательные пути, способствует отделению мокроты.

Фармакокинетика

Проницаемость через ГЭБ и плацентарный барьер - высокая; секреция с материнским молоком - высокая.

Выводится почками - 70%, через легкие - 20%, с желчью - 10%.

Показания к применению:

- хроническая сердечная недостаточность;
- коллапс;
- угнетение дыхательного центра при пневмонии и других инфекционных заболеваниях, при отравлении снотворными лекарственными средствами и наркотическими анальгетиками.

Относится к болезням:

- Инфекции
- Пневмония

Противопоказания:

- гиперчувствительность;
- эпилепсия.

Фармакологическая база данных (http://drugs.thead.ru)

С осторожностью: беременность, период лактации, детский возраст.

Способ применения и дозы:

П/к, взрослым - по 1-2 мл каждые 2-3 ч или по 4-5 мл 1-2 раза/сут.

Детям: до **1** года - 0.5-1 мл, от **1** года до **2** лет - 1 мл, **3-6** лет - 1.5 мл, **7-9** лет - 2 мл, **10-14** лет - 2.5 мл. Вводят 1-3 раза/сут.

Перед введением рекомендуется подогреть раствор до температуры тела.

Побочное действие:

Головная боль, головокружение, олеогранулема (в месте инъекции), жировая эмболия (при попадании в сосуд).

Передозировка:

Симптомы: гиперемия кожи лица, двигательное возбуждение, бред, эпилептиформные судороги.

Применение при беременности и кормлении грудью:

С осторожностью: беременность, период лактации.

Особые указания и меры предосторожности:

Применение в детском возрасте

Детям: до **1** года - 0.5-1 мл, от **1** года до **2** лет - 1 мл, **3-6** лет - 1.5 мл, **7-9** лет - 2 мл, **10-14** лет - 2.5 мл. Вводят 1-3 раза/сут.

Условия отпуска в аптеке:

По рецепту.

Источник: http://drugs.thead.ru/Kamfory_Rastvor_Dlya_Inekciy_V_Olivkovom_Masle_20