

[Камфоры Раствор Для Инъекций В Оливковом Масле 20%](#)



Полезные ссылки:

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#) [Апрель](#)
[Госреестр](#) [Википедия](#)
[РЛС VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)^{англ}

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Лекарственное средство растительного происхождения. Оказывает аналептическое, кардиотоническое, вазоконстрикторное и отхаркивающее действие.

Стимулирует дыхательный и сосудодвигательный центры продолговатого мозга. Усиливает обменные процессы в миокарде, повышая его чувствительность к влиянию симпатических нервов. Повышает тонус венозных сосудов, увеличивает приток крови к сердцу, коронарный кровоток, кровоснабжение мозга и легких. Подавляет агрегацию тромбоцитов. Выделяясь через дыхательные пути, способствует отделению мокроты.

Фармакокинетика

Проницаемость через ГЭБ и плацентарный барьер - высокая; секреция с материнским молоком - высокая.

Выводится почками - 70%, через легкие - 20%, с желчью - 10%.

Показания к применению:

— хроническая сердечная недостаточность;

— коллапс;

— угнетение дыхательного центра при пневмонии и других инфекционных заболеваниях, при отравлении снотворными лекарственными средствами и наркотическими анальгетиками.

Относится к болезням:

- [Инфекции](#)
- [Пневмония](#)

Противопоказания:

— гиперчувствительность;

— эпилепсия.

С осторожностью: беременность, период лактации, детский возраст.

Способ применения и дозы:

П/к, **взрослым** - по 1-2 мл каждые 2-3 ч или по 4-5 мл 1-2 раза/сут.

Детям: до 1 года - 0.5-1 мл, от 1 года до 2 лет - 1 мл, 3-6 лет - 1.5 мл, 7-9 лет - 2 мл, 10-14 лет - 2.5 мл. Вводят 1-3 раза/сут.

Перед введением рекомендуется подогреть раствор до температуры тела.

Побочное действие:

Головная боль, головокружение, олеогранулема (в месте инъекции), жировая эмболия (при попадании в сосуд).

Передозировка:

Симптомы: гиперемия кожи лица, двигательное возбуждение, бред, эпилептиформные судороги.

Применение при беременности и кормлении грудью:

С осторожностью: беременность, период лактации.

Особые указания и меры предосторожности:

Применение в детском возрасте

Детям: до 1 года - 0.5-1 мл, от 1 года до 2 лет - 1 мл, 3-6 лет - 1.5 мл, 7-9 лет - 2 мл, 10-14 лет - 2.5 мл. Вводят 1-3 раза/сут.

Условия отпуска в аптеке:

По рецепту.

Источник: http://drugs.thead.ru/Kamfory_Rastvor_Dlya_Inekciy_V_Olivkovom_Masle_20