Камистад



Код АТХ:

- A01AD11

Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- Лидокаин
- Ромашки аптечной цветков экстракт

Полезные ссылки:

Цена в Яндексе Горздрав Столички Апрель
Госреестр[МНН] [МНН] Википедия[МНН] [МНН] Реестр ЕАЭС
РЛС VIDAL Mail.Ru Drugs.com[англ]

Форма выпуска:

◊ ***Гель для местного применения*** желтовато-коричневого цвета.

	100 г
лидокаина гидрохлорида (в форме моногидрата)	2 г
экстракт цветков ромашки аптечной (1:4-5)*	18.5 г

Вспомогательные вещества: бензалкония хлорида 50% раствор - 200 мг, масло коричника камфорного - 100 мг, натрия сахаринат - 100 мг, карбомер - 1.5 г, трометамол - 2.81 г, муравьиная кислота 98% - 40 мг, этанол 96% - 820 мг, вода - 73.93 г.

* экстрагент: этанол 50 об.% с трометамолом 1.37%.

10 г - тубы алюминиевые (1) - пачки картонные.

Фармакотерапевтическая группа:

- Нейротропные средства
- Органотропные средства

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Комбинированный препарат. Лидокаин оказывает местноанестезирующее действие, которое способствует быстрому и продолжительному уменьшению боли при воспалении и повреждении слизистой оболочки полости рта и десен. Экстракт цветков ромашки обладает противовоспалительными, антисептическими и регенерирующими свойствами.

Показания к применению:

Болевой синдром при воспалении слизистой оболочки полости рта и губ:

— при стоматите;

— при хейлите и глетчерной эритеме губ;

— при гингивите (воспалении десен);

— при раздражении слизистой оболочки полости рта при ношении зубных протезов и брекетов;

— при прорезывании зубов "мудрости";

— при стоматологических процедурах, после ортопедических операций в челюстно-лицевой хирургии.

Относится к болезням:

- Воспаление
- Гингивит
- Стоматит
- Эритема

Противопоказания:

— гиперчувствительностьк компонентам препарата;

— беременность;

— период лактации;

— детский возраст (до 12 лет).

Способ применения и дозы:

Местно. Полоску препарата длиной 0.5 см наносят на болезненные или воспаленные участки слизистой оболочки полости рта и губ 3 раза/сут, втирая легкими массирующими движениями.

На период привыкания к зубным протезам в места сдавливания втирать полоску геля длиной 0.5 см.

Курс лечения зависит от тяжести заболевания.

Побочное действие:

Возможно: аллергические реакции. Если во время применения Камистада появились признаки аллергии, препарат следует отменить и обратиться к врачу.

Передозировка:

О случаях передозировки препарата не сообщалось.

Применение при беременности и кормлении грудью:

Противопоказан при беременности и в период лактации (грудного вскармливания).

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Случаи взаимодействия или несовместимости с другими лекарственными препаратами не описаны.

Особые указания и меры предосторожности:

Не допускается попадание препарата в глаза. До и после применения геля рекомендуется вымыть руки.

Камистад содержит сахарозаменитель натрия сахаринат.

Применение в детском возрасте

Противопоказание: детский возраст до 12 лет.

Условия хранения:

Препарат следует хранить в недоступном для детей месте при температуре не выше 30°C. Не использовать препарат после истечения срока годности, указанного на упаковке.

После вскрытия тубы использовать гель в течение 12 месяцев.

Срок годности:

5 лет.

Условия отпуска в аптеке:

Без рецепта.

Источник: http://drugs.thead.ru/Kamistad