

## Кандибене



### **Код АТХ:**

- [D01AC01](#)

### **Международное непатентованное название (Действующее вещество):**

- [Клотримазол](#)

### **Полезные ссылки:**

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#)  
[Госреестр](#)<sup>МНН</sup> [Википедия](#)<sup>МНН</sup>  
[PLC VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)<sup>англ</sup>

### **Фармакотерапевтическая группа:**

- [Противомикробные, противопаразитарные и противоглистные средства](#)
- [Противомикробные, противопаразитарные и противоглистные средства](#)

### **Фармакологические свойства:**

#### **Фармакодинамика**

Противогрибковое средство группы производных имидазола для местного применения. Оказывает действие за счет нарушения синтеза эргостерола, являющегося составной частью клеточной мембраны грибов. Обладает широким спектром действия.

Активен в отношении дерматофитов, плесневых грибов, грибов рода *Candida*, *Malassezia furfur*.

Клотримазол активен также в отношении *Corynebacterium minutissimum*, *Streptococcus* spp., *Staphylococcus* spp., *Trichomonas vaginalis*.

#### **Фармакокинетика**

При наружном применении клотримазол хорошо проникает в различные слои кожи, достигая терапевтических концентраций. При местном применении незначительное количество клотримазола всасывается в кровь.

### **Показания к применению:**

Грибковые поражения кожи и слизистых оболочек, вызванные дерматофитами, плесневыми и дрожжеподобными грибами, разноцветный лишай, эритразма, кандидозный вульвовагинит, трихомоноз, микозы, осложненные вторичной пиодермией.

## Относится к болезням:

- [Вульвит](#)
- [Дерматит](#)
- [Дерматофития](#)
- [Лишай](#)
- [Микоз](#)
- [Поражения кожи](#)
- [Разноцветный лишай](#)
- [Трихомоноз](#)
- [Эритразма](#)

## Противопоказания:

Повышенная чувствительность к клотримазолу, I триместр беременности.

## Способ применения и дозы:

При наружном применении наносят на пораженные участки кожи 2-3 раза/сут в течение 2-4 недель.

При обработке полости рта применяют 1-2 раза/сут не более 7 дней.

Интравагинально - по 100-500 мг в течение 1-6 дней.

## Побочное действие:

*Местные реакции:* контактный аллергический дерматит, покраснение, чувство жжения.

## Применение при беременности и кормлении грудью:

Противопоказан в I триместре беременности.

В экспериментальных исследованиях установлено, что при применении в высоких дозах клотримазол оказывает эмбриотоксическое действие.

Неизвестно, выделяется ли клотримазол с грудным молоком. Хотя клотримазол не противопоказан к применению при беременности и в период лактации, следует учитывать потенциальный риск при выборе противогрибковой терапии.

## Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

При одновременном применении с амфотерицином В, нистатином активность клотримазола снижается.

## Особые указания и меры предосторожности:

Лекарственные формы, предназначенные для интравагинального применения, не используются во время менструации.

Для предотвращения реинфекции необходимо одновременное лечение половых партнеров. Клотримазол не рекомендуется применять в офтальмологии.

**Источник:** <http://drugs.thead.ru/Kandibene>