Кандибиотик



Код АТХ:

- S02CA

Полезные ссылки:

Цена в Яндексе Горздрав Столички Апрель
Госреестр Википедия Реестр ЕАЭС
РЛС VIDAL Mail.Ru Drugs.com[англ]

Форма выпуска:

Капли ушные в виде прозрачной жидкости светло-желтого цвета.

	1 мл
беклометазона дипропионат	250 мкг
хлорамфеникол	50 мг
клотримазол	10 мг
лидокаина гидрохлорид (в форме моногидрата)	20 мг

Вспомогательные вещества: глицерол, пропиленгликоль.

5 мл - флаконы темного стекла (1) в комплекте с пипеткой - пачки картонные.

Фармакотерапевтическая группа:

- Гормоны и их антагонисты

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Комбинированный препарат для местного применения в ЛОР-практике.

Клотримазол - противогрибковое средство широкого спектра действия для местного применения, производное имидазола. Противогрибковый эффект клотримазола связан с нарушением синтеза эргостерина, входящего в состав клеточной мембраны грибов, что изменяет проницаемость мембраны и вызывает последующий лизис клетки.

Хлорамфеникол - бактериостатический антибиотик широкого спектра действия. Нарушает процесс синтеза белка в микробной клетке. *Активен в отношении* грамположительных и грамотрицательных бактерий.

Беклометазона дипропионат - ГКС. Оказывает противовоспалительное и противоаллергическое действие.

Лидокаина гидрохлорид - местный анестетик, вызывает обратимую блокаду проведения импульса по нервным волокнам за счет блокирования прохождения ионов натрия через мембрану.

Фармакокинетика

Исследования фармакокинетики препарата Кандибиотик не проводились.

Показания к применению:

Аллергические и воспалительные заболевания уха, в т.ч.:

— острый и диффузный наружный отит;

— острый средний отит;

— хронический отит в стадии обострения;

— состояние после хирургических вмешательств на ухе.

Относится к болезням:

- Отит

Противопоказания:

— нарушение целостности барабанной перепонки;

— детский возраст до 6 лет;

— повышенная чувствительность к компонентам препарата.

Способ применения и дозы:

Препарат закапывают в наружный слуховой проход по 4-5 капель 3-4 раза/сут. Улучшение состояния наступает в течение 3-5 дней. Курс лечения составляет 7-10 дней.

Побочное действие:

Местные реакции: редко - зуд, жжение в месте нанесения препарата.

Прочие: аллергические реакции.

Передозировка:

Данные о передозировке препарата Кандибиотик не предоставлены.

Применение при беременности и кормлении грудью:

Вопрос о целесообразности назначения препарата при беременности решается врачом индивидуально. Назначение препарата возможно в случае, когда предполагаемая польза терапии для матери превышает потенциальный риск для плода.

Данные о безопасности применения препарата в период лактации (грудного вскармливания) не предоставлены.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Лекарственное взаимодействие препарата Кандибиотик не изучено.

Особые указания и меры предосторожности:

Применение в детском возрасте

Противопоказание: детский возраст до 6 лет.

Условия хранения:

Препарат следует хранить в сухом, защищенном от света месте при температуре не выше 25°С.

Срок годности:

2 года.

Условия отпуска в аптеке:

По рецепту.

Источник: http://drugs.thead.ru/Kandibiotik