

## [Кандибиотик](#)



### Код АТХ:

- [S02CA](#)

### Полезные ссылки:

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#)  
[Госреестр](#) [Википедия](#)  
[РЛС VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)<sup>англ</sup>

### Форма выпуска:

**Капли ушные** в виде прозрачной жидкости светло-желтого цвета.

	<b>1 мл</b>
беклометазона дипропионат	250 мкг
хлорамфеникол	50 мг
клотримазол	10 мг
лидокаина гидрохлорид (в форме моногидрата)	20 мг

*Вспомогательные вещества:* глицерол, пропиленгликоль.

5 мл - флаконы темного стекла (1) в комплекте с пипеткой - пачки картонные.

### Фармакотерапевтическая группа:

- [Гормоны и их антагонисты](#)

### Фармакологические свойства:

#### Фармакодинамика

Комбинированный препарат для местного применения в ЛОР-практике.

Клотримазол - противогрибковое средство широкого спектра действия для местного применения, производное имидазола. Противогрибковый эффект клотримазола связан с нарушением синтеза эргостерина, входящего в состав клеточной мембраны грибов, что изменяет проницаемость мембраны и вызывает последующий лизис клетки.

Хлорамфеникол - бактериостатический антибиотик широкого спектра действия. Нарушает процесс синтеза белка в микробной клетке. *Активен в отношении* грамположительных и грамотрицательных бактерий.

Беклометазона дипропионат - ГКС. Оказывает противовоспалительное и противоаллергическое действие.

Лидокаина гидрохлорид - местный анестетик, вызывает обратимую блокаду проведения импульса по нервным волокнам за счет блокирования прохождения ионов натрия через мембрану.

**Фармакокинетика**

Исследования фармакокинетики препарата Кандибиотик не проводились.

**Показания к применению:**

Аллергические и воспалительные заболевания уха, в т.ч.:

- острый и диффузный наружный отит;
- острый средний отит;
- хронический отит в стадии обострения;
- состояние после хирургических вмешательств на ухе.

**Относится к болезням:**

- [Отит](#)

**Противопоказания:**

- нарушение целостности барабанной перепонки;
- детский возраст до 6 лет;
- повышенная чувствительность к компонентам препарата.

**Способ применения и дозы:**

Препарат закапывают в наружный слуховой проход по 4-5 капель 3-4 раза/сут. Улучшение состояния наступает в течение 3-5 дней. Курс лечения составляет 7-10 дней.

**Побочное действие:**

*Местные реакции:* редко - зуд, жжение в месте нанесения препарата.

*Прочие:* аллергические реакции.

**Передозировка:**

Данные о передозировке препарата Кандибиотик не предоставлены.

**Применение при беременности и кормлении грудью:**

Вопрос о целесообразности назначения препарата при беременности решается врачом индивидуально. Назначение препарата возможно в случае, когда предполагаемая польза терапии для матери превышает потенциальный риск для плода.

Данные о безопасности применения препарата в период лактации (грудного вскармливания) не предоставлены.

## **Взаимодействие с другими лекарственными средствами:**

Лекарственное взаимодействие препарата Кандибиотик не изучено.

## **Особые указания и меры предосторожности:**

### ***Применение в детском возрасте***

Противопоказание: детский возраст до 6 лет.

## **Условия хранения:**

Препарат следует хранить в сухом, защищенном от света месте при температуре не выше 25°C.

## **Срок годности:**

2 года.

## **Условия отпуска в аптеке:**

По рецепту.

**Источник:** <http://drugs.thead.ru/Kandibiotik>