

Кандид



Код АТХ:

- [G01AF02](#)

Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- [Клотримазол](#)

Полезные ссылки:

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#)

[Госреестр](#)^{МНН} [Википедия](#)^{МНН}

[РЛС VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)^{англ}

Форма выпуска:

◇ **Раствор для наружного применения 1%** в виде прозрачной, бесцветной, вязкой жидкости.

	1 мл
клотримазол	10 мг

Вспомогательные вещества: пропиленгликоль.

20 мл - флаконы полиэтиленовые (1) - пачки картонные.

◇ **Крем для наружного применения 1%** белого цвета, однородный.

	1 г
клотримазол	10 мг

Вспомогательные вещества: пропиленгликоль, парафин жидкий, эмульсионный воск (цетомакрогол), вазелин белый, спирт бензиловый, метилпарабен, пропилпарабен, натрия фосфат безводный, натрия дигидрофосфат (натрия фосфат однозамещенный), бутилгидрокситолуол, вода очищенная.

20 г - тубы алюминиевые (1) - пачки.

Фармакотерапевтическая группа:

- [Противомикробные, противопаразитарные и противоглистные средства](#)

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Противогрибковый препарат широкого спектра действия для наружного применения. Производное имидазола. Нарушает синтез эргостерина, входящего в состав клеточной мембраны грибов, что приводит к лизису клетки.

Активен в отношении дерматофитов (*Trichophyton*, *Epidermophyton*, *Microsporum*), дрожжевых и дрожжеподобных грибов (*Candida*, *Torulopsis*, *Rhodotulora*), плесневых грибов, а также *Malassezia furfur*, *Aspergillus*; некоторых штаммов грамположительных бактерий (*Streptococcus* spp., *Staphylococcus* spp., *Corynebacterium minutissimum*), грамотрицательных бактерий (*Bacteroides* spp., *Gardnerella vaginalis*), а также *Trichomonas vaginalis*.

Фармакокинетика

При наружном применении клотримазол хорошо проникает в различные слои кожи, достигая терапевтических концентраций.

Показания к применению:

- дерматофития головы (в т.ч. лица), тела, ног;
- микоз ногтей;
- разноцветный лишай;
- кандидоз кожи;
- кандидозная паронихия;
- кандидозный вульвит;
- кандидозный баланит;
- кандидоз наружных половых органов и аноректальной области;
- грибковый пеленочный дерматит;
- эритразма.

Относится к болезням:

- [Баланит](#)
- [Вульвит](#)
- [Дерматит](#)
- [Дерматофития](#)
- [Лишай](#)
- [Микоз](#)
- [Разноцветный лишай](#)
- [Эритразма](#)

Противопоказания:

- повышенная чувствительность к клотримазолу.

Способ применения и дозы:

Необходимое количество крема или лосьона наносят на предварительно вымытый и сухой пораженный участок кожи 2-3 раза/сут. Лечение следует продолжать еще в течение 2-4 недель после исчезновения клинических симптомов для обеспечения микологического излечения и предотвращения рецидивов.

Препарат в форме лосьона применяют при больших поражениях и на волосистых участках кожи.

Побочное действие:

Кандид

Фармакологическая база данных (<http://drugs.thead.ru>)

Редко: местное раздражение, которое исчезает самостоятельно при продолжении терапии.

Передозировка:

В настоящее время о случаях передозировки препарата Кандид не сообщалось.

Применение при беременности и кормлении грудью:

Безопасность применения препарата Кандид при беременности и в период лактации не установлена. Поэтому следует избегать назначения препарата в высоких дозах (на обширных участках кожи) или в течение длительного времени в данные периоды.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

При одновременном применении с нистатином активность Кандида может снижаться.

Особые указания и меры предосторожности:

Необходимо избегать применения препарата на участках кожи с нарушениями целостности кожных покровов.

Условия хранения:

Препарат следует хранить в сухом, защищенном от света месте.

Условия отпуска из аптек

Препарат разрешен к применению в качестве средства безрецептурного отпуска.

Источник: <http://drugs.thead.ru/Kandid>