Кандид



Код АТХ:

- G01AF02

Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- Клотримазол

Полезные ссылки:

Цена в Яндексе Горздрав Столички Апрель
Госреестр[МНН] Википедия[МНН] Реестр ЕАЭС
РЛС VIDAL Mail.Ru Drugs.com[англ]

Форма выпуска:

◊ ***Раствор для наружного применения 1%*** в виде прозрачной, бесцветной, вязкой жидкости.

	1 мл
клотримазол	10 мг

Вспомогательные вещества: пропиленгликоль.

20 мл - флаконы полиэтиленовые (1) - пачки картонные.

◊ ***Крем для наружного применения 1%*** белого цвета, однородный.

	1 г
клотримазол	10 мг

Вспомогательные вещества: пропиленгликоль, парафин жидкий, эмульсионный воск (цетомакрогол), вазелин белый, спирт бензиловый, метилпарабен, пропилпарабен, натрия фосфат безводный, натрия дигидрофосфат (натрия фосфат однозамещенный), бутилгидрокситолуол, вода очищенная.

20 г - тубы алюминиевые (1) - пачки.

Фармакотерапевтическая группа:

- Противомикробные, противопаразитарные и противоглистные средства

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Противогрибковый препарат широкого спектра действия для наружного применения. Производное имидазола. Нарушает синтез эргостерина, входящего в состав клеточной мембраны грибов, что приводит к лизису клетки.

Активен в отношении дерматофитов (Trichophyton, Epidermophyton, Microsporum), дрожжевых и дрожжеподобных грибов (Candida, Torulopsis, Rhodoturola), плесневых грибов, а также Malassezia furfur, Aspergillus; некоторых штаммов *грамположительных бактерий* (Streptococcus spp., Staphylococcus spp., Corynebacterium minutissimum), *грамотрицательных бактерий* (Bacteroides spp., Gardnerella vaginalis), а также Trichomonas vaginalis.

Фармакокинетика

При наружном применении клотримазол хорошо проникает в различные слои кожи, достигая терапевтических концентраций.

Показания к применению:

—дерматофития головы (в т.ч. лица), тела, ног;

—микоз ногтей;

—разноцветный лишай;

—кандидоз кожи;

—кандидозная паронихия;

—кандидозный вульвит;

—кандидозный баланит;

—кандидоз наружных половых органов и аноректальной области;

—грибковый пеленочный дерматит;

—эритразма.

Относится к болезням:

- Баланит
- Вульвит
- Дерматит
- Дерматофития
- Лишай
- Микоз
- Разноцветный лишай
- Эритразма

Противопоказания:

— повышенная чувствительность к клотримазолу.

Способ применения и дозы:

Необходимое количество крема или лосьона наносят на предварительно вымытый и сухой пораженный участок кожи 2-3 раза/сут. Лечение следует продолжать еще в течение 2-4 недель после исчезновения клинических симптомов для обеспечения микологического излечения и предотвращения рецидивов.

Препарат в форме лосьона применяют при больших поражениях и на волосистых участках кожи.

Побочное действие:

Редко: местное раздражение, которое исчезает самостоятельно при продолжении терапии.

Передозировка:

В настоящее время о случаях передозировки препарата Кандид не сообщалось.

Применение при беременности и кормлении грудью:

Безопасность применения препарата Кандид при беременности и в период лактации не установлена. Поэтому следует избегать назначения препарата в высоких дозах (на обширных участках кожи) или в течение длительного времени в данные периоды.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

При одновременном применении с нистатином активность Кандида может снижаться.

Особые указания и меры предосторожности:

Необходимо избегать применения препарата на участках кожи с нарушениями целостности кожных покровов.

Условия хранения:

Препарат следует хранить в сухом, защищенном от света месте.

Условия отпуска из аптек

Препарат разрешен к применению в качестве средства безрецептурного отпуска.

Источник: http://drugs.thead.ru/Kandid