Кандид-В6



Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- Клотримазол

Полезные ссылки:

Цена в Яндексе Горздрав Столички Апрель
Госреестр[МНН] Википедия[МНН] Реестр ЕАЭС
РЛС VIDAL Mail.Ru Drugs.com[англ]

Форма выпуска:

◊ ***Таблетки вагинальные*** белого цвета, овальные, двояковыпуклые, без оболочки, усеченные с одной стороны, с монограммой "G" на одной стороне и знаком "V6" - на другой стороне.

	1 таб.
клотримазол	100 мг

Вспомогательные вещества: адипиновая кислота, крахмал кукурузный, кремния диоксид коллоидный, лактоза, магния стеарат, метилпарагидроксибензоат (нипагин), натрия гидрокарбонат, натрия гликолат (примогель), повидон К-30, пропилпарагидроксибензоат (нипазол), тальк.

6 шт. - стрипы из алюминиевой фольги (1) в комплекте с аппликатором - пачки картонные.

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Противогрибковый препарат для местного применения, производное имидазола. Нарушает синтез эргостерина, входящего в состав клеточной мембраны грибов, что вызывает изменение ее свойств и приводит к лизису клетки.

Препарат *активен в отношении* дерматофитов (Trichophyton, Epidermophyton, Microsporum), дрожжевых и дрожжеподобных грибов (Candida, Torulopsis glabrata, Rhodotorula), плесневых грибов, а также Malassezia furfur, Aspergillus; некоторых штаммов грамположительных бактерий (Streptococcus spp., Staphylococcus spp., Corynebacterium minutissimum), грамотрицательных бактерий (Bacteroides spp., Gardnerella vaginalis), а также Trichomonas vaginalis.

Показания к применению:

—кандидозный вульвовагинит;

—трихомониаз;

—генитальные суперинфекции, вызванные бактериями, чувствительными к клотримазолу (смешанные инфекции влагалища, бактериальный вагинит).

Относится к болезням:

- Вагинит
- Вульвит
- Инфекции
- Трихомониаз

Противопоказания:

— повышенная чувствительность к клотримазолу.

Способ применения и дозы:

Назначают интравагинально по 100 мг (1 таб.) 1 раз/сут (вечером) в течение 6 дней. Вагинальные таблетки следует вводить как можно глубже во влагалище. При необходимости курс лечения можно повторить.

Побочное действие:

Редко: ощущение жжения сразу после введения таблетки (не требует прекращения лечения).

Передозировка:

В настоящее время о случаях передозировки препарата Кандид В6 не сообщалось.

Применение при беременности и кормлении грудью:

При проведении клинических и экспериментальных исследований установлено, что применение Кандида В6 при беременности и в период лактации не оказывает отрицательного воздействия на организм женщины, плода или ребенка. Однако вопрос о назначении препарата должен решаться индивидуально в каждом конкретном случае. При необходимости применения Кандида В6 при беременности использование аппликатора не рекомендуется.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

При одновременном вагинальном введении Кандид В6 снижает активность амфотерицина В и других полиеновых антибиотиков.

При одновременном применении с нистатином активность Кандида В6 может снижаться.

Особые указания и меры предосторожности:

Для предупреждения урогенитальных реинфекций необходимо одновременное лечение обоих половых партнеров.

При трихомониазе рекомендуется сочетать местное лечение Кандидом В6 с препаратами системного действия (например, метронидазолом).

Вагинальные таблетки не рекомендуется использовать во время менструации.

Условия хранения:

Препарат следует хранить в защищенном от света месте при температуре не выше 25°С.

Условия отпуска из аптек

Препарат разрешен к применению в качестве средства безрецептурного отпуска.

Срок годности:

3 года.

Источник: http://drugs.thead.ru/Kandid-V6