

## Кандид-В6



### Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- [Клотримазол](#)

### Полезные ссылки:

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#)  
[Госреестр](#)<sup>МНН</sup> [Википедия](#)<sup>МНН</sup>  
[РЛС VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)<sup>англ</sup>

### Форма выпуска:

◇ **Таблетки вагинальные** белого цвета, овальные, двояковыпуклые, без оболочки, усеченные с одной стороны, с монограммой "G" на одной стороне и знаком "V6" - на другой стороне.

	<b>1 таб.</b>
клотримазол	100 мг

**Вспомогательные вещества:** адипиновая кислота, крахмал кукурузный, кремния диоксид коллоидный, лактоза, магния стеарат, метилпарагидроксибензоат (нипагин), натрия гидрокарбонат, натрия гликолат (примогель), повидон К-30, пропилпарагидроксибензоат (нипазол), тальк.

6 шт. - стрипы из алюминиевой фольги (1) в комплекте с аппликатором - пачки картонные.

### Фармакологические свойства:

#### Фармакодинамика

Противогрибковый препарат для местного применения, производное имидазола. Нарушает синтез эргостерина, входящего в состав клеточной мембраны грибов, что вызывает изменение ее свойств и приводит к лизису клетки.

Препарат *активен в отношении* дерматофитов (*Trichophyton*, *Epidermophyton*, *Microsporum*), дрожжевых и дрожжеподобных грибов (*Candida*, *Torulopsis glabrata*, *Rhodotorula*), плесневых грибов, а также *Malassezia furfur*, *Aspergillus*; некоторых штаммов грамположительных бактерий (*Streptococcus* spp., *Staphylococcus* spp., *Corynebacterium minutissimum*), грамотрицательных бактерий (*Bacteroides* spp., *Gardnerella vaginalis*), а также *Trichomonas vaginalis*.

## Показания к применению:

—кандидозный вульвовагинит;

—трихомоноз;

—генитальные суперинфекции, вызванные бактериями, чувствительными к клотримазолу (смешанные инфекции влагалища, бактериальный вагинит).

## Относится к болезням:

- [Вагинит](#)
- [Вульвит](#)
- [Инфекции](#)
- [Трихомоноз](#)

## Противопоказания:

— повышенная чувствительность к клотримазолу.

## Способ применения и дозы:

Назначают интравагинально по 100 мг (1 таб.) 1 раз/сут (вечером) в течение 6 дней. Вагинальные таблетки следует вводить как можно глубже во влагалище. При необходимости курс лечения можно повторить.

## Побочное действие:

*Редко:* ощущение жжения сразу после введения таблетки (не требует прекращения лечения).

## Передозировка:

В настоящее время о случаях передозировки препарата Кандид В6 не сообщалось.

## Применение при беременности и кормлении грудью:

При проведении клинических и экспериментальных исследований установлено, что применение Кандида В6 при беременности и в период лактации не оказывает отрицательного воздействия на организм женщины, плода или ребенка. Однако вопрос о назначении препарата должен решаться индивидуально в каждом конкретном случае. При необходимости применения Кандида В6 при беременности использование аппликатора не рекомендуется.

## Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

При одновременном вагинальном введении Кандид В6 снижает активность амфотерицина В и других полиеновых антибиотиков.

При одновременном применении с нистатином активность Кандида В6 может снижаться.

## Особые указания и меры предосторожности:

Для предупреждения урогенитальных реинфекций необходимо одновременное лечение обоих половых партнеров.

При трихомонозе рекомендуется сочетать местное лечение Кандидом В6 с препаратами системного действия (например, метронидазолом).

Вагинальные таблетки не рекомендуется использовать во время менструации.

### **Условия хранения:**

Препарат следует хранить в защищенном от света месте при температуре не выше 25°C.

*Условия отпуска из аптек*

Препарат разрешен к применению в качестве средства безрецептурного отпуска.

### **Срок годности:**

3 года.

**Источник:** <http://drugs.thead.ru/Kandid-V6>