

Кандид Б



Код АТХ:

- [D07BC](#)

Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- [Беклометазон](#)
- [Клотримазол](#)

Полезные ссылки:

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#) [Апрель](#)
[Госреестр](#)^{МНН МНН} [Википедия](#)^{МНН МНН}
[РЛС VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)^{англ}

Форма выпуска:

Крем для наружного применения белого цвета, однородный.

	1 г
беклометазон (в форме дипропионата)	250 мкг
клотримазол	10 мг

Вспомогательные вещества: бензиловый спирт, вазелин белый, парафин жидкий, цетомакрогол, пропиленгликоль, метилпарагидроксibenзоат, пропилпарагидроксibenзоат, бутилгидрокситолуол, натрия фосфат безводный, натрия дигидрофосфат, вода очищенная.

15 г - тубы алюминиевые (1) - пачки картонные.

Фармакотерапевтическая группа:

- [Гормоны и их антагонисты](#)

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Комбинированный препарат для наружного применения. Клотримазол является производным имидазола. Нарушает синтез эргостерина, входящего в состав клеточной мембраны грибов, что вызывает изменение ее свойств и приводит к лизису клетки. Беклометазон - глюкокортикоид, оказывает противовоспалительное, противоаллергическое, антиэкссудативное, противозудное действие.

Препарат *активен в отношении* дерматофитов (*Trichophyton*, *Epidermophyton*, *Microsporum*), дрожжевых и дрожжеподобных грибов (*Candida*, *Torulopsis*, *Rhodotulora*), плесневых грибов, а также *Malassezia furfur*, *Aspergillus*; некоторых штаммов грамположительных бактерий (*Streptococcus* spp., *Staphylococcus* spp., *Corynebacterium minutissimum*), грамотрицательных бактерий (*Bacteroides* spp., *Gardnerella vaginalis*), а также *Trichomonas vaginalis*.

Фармакокинетика

Данные по фармакокинетике препарата Кандид Б не предоставлены.

Показания к применению:

Микозы кожи (в т.ч. осложненные острыми экзематозными симптомами):

- дерматомикозы различных частей тела;
- эпидермофития стоп;
- дерматозы, осложненные вторичной инфекцией.

Относится к болезням:

- [Дерматит](#)
- [Инфекции](#)
- [Экзема](#)
- [Эпидермофития](#)

Противопоказания:

- специфические поражения кожи (в т.ч. при туберкулезе, ветряной оспе, простом герпесе, кори, сифилисе);
- кожные реакции на месте вакцинации;
- повышенная чувствительность к компонентам препарата.

Способ применения и дозы:

Перед нанесением крема следует промыть и просушить пораженный участок. Крем следует наносить непосредственно на пораженные области, обеспечивая прямой контакт препарата с кожей, в т.ч. на волосистых участках тела. Препарат применяют 2-3 раза/сут.

После исчезновения экзематозных симптомов рекомендуется переходить на лечение кремом Кандид до полного исчезновения первичной грибковой инфекции.

Побочное действие:

Местные реакции: покраснение кожи, ощущение жжения и покалывания в месте нанесения препарата (при развитии раздражения препарат необходимо отменить).

Возможно: аллергические реакции.

Передозировка:

Острая передозировка при наружном применении препарата Кандид Б маловероятна.

Применение при беременности и кормлении грудью:

Безопасность применения препарата Кандид Б при беременности и в период лактации не установлена. Поэтому следует избегать назначения препарата в больших количествах или в течение длительного времени в данные периоды.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Лекарственное взаимодействие препарата Кандид Б не описано.

Особые указания и меры предосторожности:

Препарат предназначен для использования только в дерматологической практике.

Применение препарата Кандид Б в составе комплексной терапии кандидозов аногенитальной области позволяет быстро достигнуть значительного улучшения состояния пациента.

Следует учитывать, что при наружном применении глюкокортикоидов на больших участках кожи или с окклюзионными повязками возможна их системная абсорбция.

При применении окклюзионных повязок возможно развитие сыпи, фолликулита, пиодермии.

Условия хранения:

Препарат следует хранить в сухом, защищенном от света месте при температуре ниже 25°C.

Срок годности:

3 года.

Условия отпуска в аптеке:

По рецепту.

Источник: http://drugs.thead.ru/Kandid_B