Кандид Б



Код АТХ:

D07BC

Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- Беклометазон
- Клотримазол

Полезные ссылки:

Цена в Яндексе Горздрав Столички Апрель Госреестр^{МНН МНН} Википедия^{МНН МНН} РЛС VIDAL Mail.Ru Drugs.com^{англ}

Форма выпуска:

Крем для наружного применения белого цвета, однородный.

крем для наружного применения ослого цвета, однородный.	
	1 r
беклометазон (в форме дипропионата)	250 мкг
клотримазол	10 мг

Вспомогательные вещества: бензиловый спирт, вазелин белый, парафин жидкий, цетомакрогол, пропиленгликоль, метилпарагидроксибензоат, пропилпарагидроксибензоат, бутилгидрокситолуол, натрия фосфат безводный, натрия дигидрофосфат, вода очищенная.

15 г - тубы алюминиевые (1) - пачки картонные.

Фармакотерапевтическая группа:

• Гормоны и их антагонисты

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Комбинированный препарат для наружного применения. Клотримазол является производным имидазола. Нарушает синтез эргостерина, входящего в состав клеточной мембраны грибов, что вызывает изменение ее свойств и приводит к лизису клетки. Беклометазон - глюкокортикоид, оказывает противовоспалительное, противоаллергическое, антиэкссудативное, противозудное действие.

Препарат *активен в отношении* дерматофитов (Trichophyton, Epidermophyton, Microsporum), дрожжевых и дрожжеподобных грибов (Candida, Torulopsis, Rhodoturola), плесневых грибов, а также Malassezia furfur, Aspergillus; некоторых штаммов грамположительных бактерий (Streptococcus spp., Staphylococcus spp., Corynebacterium minutissimum), грамотрицательных бактерий (Bacteroides spp., Gardnerella vaginalis), а также Trichomonas vaginalis.

Фармакокинетика

Данные по фармакокинетике препарата Кандид Б не предоставлены.

Показания к применению:

Микозы кожи (в т.ч осложненные острыми экзематозными симптомами):

- дерматомикозы различных частей тела;
- эпидермофития стоп;
- дерматозы, осложненные вторичной инфекцией.

Относится к болезням:

- Дерматит
- Инфекции
- Экзема
- Эпидермофития

Противопоказания:

- специфические поражения кожи (в т.ч. при туберкулезе, ветряной оспе, простом герпесе, кори, сифилисе);
- кожные реакции на месте вакцинации;
- повышенная чувствительность к компонентам препарата.

Способ применения и дозы:

Перед нанесением крема следует промыть и просушить пораженный участок. Крем следует наносить непосредственно на пораженные области, обеспечивая прямой контакт препарата с кожей, в т.ч. на волосистых участках тела. Препарат применяют 2-3 раза/сут.

После исчезновения экзематозных симптомов рекомендуется переходить на лечение кремом Кандид до полного исчезновения первичной грибковой инфекции.

Побочное действие:

Местные реакции: покраснение кожи, ощущение жжения и покалывания в месте нанесения препарата (при развитии раздражения препарат необходимо отменить).

Возможно: аллергические реакции.

Передозировка:

Острая передозировка при наружном применении препарата Кандид Б маловероятна.

Применение при беременности и кормлении грудью:

Безопасность применения препарата Кандид Б при беременности и в период лактации не установлена. Поэтому следует избегать назначения препарата в больших количествах или в течение длительного времени в данные периоды.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Лекарственное взаимодействие препарата Кандид Б не описано.

Особые указания и меры предосторожности:

Препарат предназначен для использования только в дерматологической практике.

Применение препарата Кандид Б в составе комплексной терапии кандидозов аногенитальной области позволяет быстро достигнуть значительного улучшения состояния пациента.

Следует учитывать, что при наружном применении глюкокортикоидов на больших участках кожи или с окклюзионными повязками возможна их системная абсорбция.

При применении окклюзионных повязок возможно развитие сыпи, фолликулита, пиодермии.

Условия хранения:

Препарат следует хранить в сухом, защищенном от света месте при температуре ниже 25°C.

Срок годности:

3 года.

Условия отпуска в аптеке:

По рецепту.

Источник: http://drugs.thead.ru/Kandid_B