Кандид (порошок)



Код АТХ:

- G01AF02

Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- Клотримазол

Полезные ссылки:

Цена в Яндексе Горздрав Столички Апрель
Госреестр[МНН] Википедия[МНН] Реестр ЕАЭС
РЛС VIDAL Mail.Ru Drugs.com[англ]

Форма выпуска:

◊ ***Порошок для наружного применения*** белого цвета, с характерным запахом.

	1 г
клотримазол	10 мг

Вспомогательные вещества: тальк очищенный, крахмал кукурузный, кремния диоксид коллоидный, отдушка косметическая.

30 г - флаконы пластиковые (1) - пачки картонные.

Фармакотерапевтическая группа:

- Противомикробные, противопаразитарные и противоглистные средства

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Противогрибковый препарат широкого спектра действия для наружного применения, производное имидазола. Антимикотический эффект связан с нарушением синтеза эргостерина, входящего в состав клеточной мембраны

грибов, что вызывает изменение ее структуры и свойств и приводит к лизису клетки.

К клотримазолу *чувствительны* дерматофиты, дрожжеподобные грибы (рода Candida, Torulopsis glabrata, Rhodotorula), плесневые грибы, а также возбудитель разноцветного лишая Pityriasis versicolor и возбудитель эритразмы.

Оказывает противомикробное действие в отношении грамположительных (стафилококки и стрептококки) и грамотрицательных бактерий (Bacteroides, Gardnerella vaginalis), а также в отношении Trichomonas vaginalis.

Фармакокинетика

Клотримазол плохо всасывается через кожу и слизистые оболочки и практически не оказывает системного действия.

При наружном применении концентрация клотримазола в эпидермисе выше, чем в дерме и подкожной клетчатке.

Показания к применению:

— грибковые инфекции кожи;

— межпальцевые грибковые эрозии;

— микозы, осложненные вторичной инфекцией;

— разноцветный лишай;

— эритразма.

Относится к болезням:

- Инфекции
- Лишай
- Микоз
- Разноцветный лишай
- Эритразма

Противопоказания:

— I триместр беременности;

— повышенная чувствительность к клотримазолу или вспомогательным веществам.

С *осторожностью* следует назначать препарат в период лактации.

Способ применения и дозы:

Наружно. Порошок наносят на пораженный участок кожи 3-4 раза/сут. Улучшение состояния наступает в течение 3-5 дней. Для успешного лечения важно регулярное применение препарата. Длительность терапии индивидуальна и зависит от тяжести и локализации заболевания. Для достижения полного выздоровления не следует прекращать лечение препаратом сразу же после исчезновения острых симптомов воспаления или субъективных жалоб.

Длительность терапии должна составлять, в среднем около, 4 недель; при *отрубевидном лишае* - 1-3 недель, при *эритразме* - 2-4 недель. При *межпальцевых грибковых эрозиях ног* рекомендуется продолжить терапию около 2 недель после купирования симптомов заболевания.

Побочное действие:

Местные реакции: редко - жжение, покалывание в местах нанесения препарата, эритема, появление волдырей, отек, раздражение, шелушение.

Аллергические реакции: возможны зуд, крапивница.

Передозировка:

В настоящее время о случаях передозировки препарата Кандид не сообщалось.

Применение при беременности и кормлении грудью:

Не рекомендуется применение препарата в I триместре беременности. Вопрос о целесообразности назначения препарат во II и III триместрах должен решаться индивидуально после консультации врача.

В клинических и экспериментальных исследованиях отрицательное влияние на здоровье женщины или плода не установлено.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Клотримазол снижает активность амфотерицина В и других полиеновых антибиотиков.

При одновременном применении с натамицином и нистатином активность клотримазола может снижаться.

Условия хранения:

Препарат следует хранить в недоступном для детей месте при температуре не выше 25°С.

Срок годности:

4 года.

Условия отпуска в аптеке:

Без рецепта.

Источник: http://drugs.thead.ru/Kandid_poroshok