

Кандид (порошок)



Код АТХ:

- [G01AF02](#)

Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- [Клотримазол](#)

Полезные ссылки:

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#) [Апрель](#)
[Госреестр](#)^{МНН} [Википедия](#)^{МНН}
[РЛС VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)^{англ}

Форма выпуска:

◇ **Порошок для наружного применения** белого цвета, с характерным запахом.

	1 г
клотримазол	10 мг

Вспомогательные вещества: тальк очищенный, крахмал кукурузный, кремния диоксид коллоидный, отдушка косметическая.

30 г - флаконы пластиковые (1) - пачки картонные.

Фармакотерапевтическая группа:

- [Противомикробные, противопаразитарные и противоглистные средства](#)

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Противогрибковый препарат широкого спектра действия для наружного применения, производное имидазола. Антимикотический эффект связан с нарушением синтеза эргостерина, входящего в состав клеточной мембраны

Кандид (порошок)

Фармакологическая база данных (<http://drugs.thead.ru>)

грибов, что вызывает изменение ее структуры и свойств и приводит к лизису клетки.

К клотримазолу чувствительны дерматофиты, дрожжеподобные грибы (рода *Candida*, *Torulopsis glabrata*, *Rhodotorula*), плесневые грибы, а также возбудитель разноцветного лишая *Pityriasis versicolor* и возбудитель эритразмы.

Оказывает противомикробное действие в отношении грамположительных (стафилококки и стрептококки) и грамотрицательных бактерий (*Bacteroides*, *Gardnerella vaginalis*), а также в отношении *Trichomonas vaginalis*.

Фармакокинетика

Клотримазол плохо всасывается через кожу и слизистые оболочки и практически не оказывает системного действия.

При наружном применении концентрация клотримазола в эпидермисе выше, чем в дерме и подкожной клетчатке.

Показания к применению:

- грибковые инфекции кожи;
- межпальцевые грибковые эрозии;
- микозы, осложненные вторичной инфекцией;
- разноцветный лишай;
- эритразма.

Относится к болезням:

- [Инфекции](#)
- [Лишай](#)
- [Микоз](#)
- [Разноцветный лишай](#)
- [Эритразма](#)

Противопоказания:

- I триместр беременности;
- повышенная чувствительность к клотримазолу или вспомогательным веществам.

С осторожностью следует назначать препарат в период лактации.

Способ применения и дозы:

Наружно. Порошок наносят на пораженный участок кожи 3-4 раза/сут. Улучшение состояния наступает в течение 3-5 дней. Для успешного лечения важно регулярное применение препарата. Длительность терапии индивидуальна и зависит от тяжести и локализации заболевания. Для достижения полного выздоровления не следует прекращать лечение препаратом сразу же после исчезновения острых симптомов воспаления или субъективных жалоб.

Длительность терапии должна составлять, в среднем около, 4 недель; при *отрубевидном лишае* - 1-3 недель, при *эритразме* - 2-4 недель. При *межпальцевых грибковых эрозиях ног* рекомендуется продолжить терапию около 2 недель после купирования симптомов заболевания.

Побочное действие:

Местные реакции: редко - жжение, покалывание в местах нанесения препарата, эритема, появление волдырей, отек, раздражение, шелушение.

Аллергические реакции: возможны зуд, крапивница.

Передозировка:

Кандид (порошок)

Фармакологическая база данных (<http://drugs.thead.ru>)

В настоящее время о случаях передозировки препарата Кандид не сообщалось.

Применение при беременности и кормлении грудью:

Не рекомендуется применение препарата в I триместре беременности. Вопрос о целесообразности назначения препарат во II и III триместрах должен решаться индивидуально после консультации врача.

В клинических и экспериментальных исследованиях отрицательное влияние на здоровье женщины или плода не установлено.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Клотримазол снижает активность амфотерицина В и других полиеновых антибиотиков.

При одновременном применении с натамицином и нистатином активность клотримазола может снижаться.

Условия хранения:

Препарат следует хранить в недоступном для детей месте при температуре не выше 25°C.

Срок годности:

4 года.

Условия отпуска в аптеке:

Без рецепта.

Источник: http://drugs.thead.ru/Kandid_poroshok