

[**Кандид \(таблетки\)**](#)



Код АТХ:

- [G01AF02](#)

Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- [Клотримазол](#)

Полезные ссылки:

[Цена в Яндексе](#) [Горздрав](#) [Столички](#) [Апрель](#)

[Госреестр](#)^{МНН} [Википедия](#)^{МНН}

[РЛС VITAL](#) [Mail.Ru Drugs.com](#)^{англ}

Фармакотерапевтическая группа:

- [Противомикробные, противопаразитарные и противоглистные средства](#)

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Противогрибковое средство группы производных имидазола для местного применения. Оказывает действие за счет нарушения синтеза эргостерола, являющегося составной частью клеточной мембрани грибов. Обладает широким спектром действия.

Активен в отношении дерматофитов, плесневых грибов, грибов рода *Candida*, *Malassezia furfur*.

Клотримазол активен также в отношении *Corynebacterium minutissimum*, *Streptococcus* spp., *Staphylococcus* spp., *Trichomonas vaginalis*.

Фармакокинетика

При наружном применении клотримазол хорошо проникает в различные слои кожи, достигая терапевтических концентраций. При местном применении незначительное количество клотримазола всасывается в кровь.

Показания к применению:

Грибковые поражения кожи и слизистых оболочек, вызванные дерматофитами, плесневыми и дрожжеподобными грибами, разноцветный лишай, эритразма, кандидозный вульвовагинит, трихомониаз, микозы, осложненные вторичной пиодермией.

Относится к болезням:

- [Вульвит](#)
- [Дерматит](#)
- [Дерматофития](#)
- [Лишай](#)
- [Микоз](#)
- [Поражения кожи](#)
- [Разноцветный лишай](#)
- [Трихомониаз](#)
- [Эритразма](#)

Противопоказания:

Повышенная чувствительность к клотrimазолу, I триместр беременности.

Способ применения и дозы:

При наружном применении наносят на пораженные участки кожи 2-3 раза/сут в течение 2-4 недель.

При обработке полости рта применяют 1-2 раза/сут не более 7 дней.

Интравагинально - по 100-500 мг в течение 1-6 дней.

Побочное действие:

Местные реакции: контактный аллергический дерматит, покраснение, чувство жжения.

Применение при беременности и кормлении грудью:

Противопоказан в I триместре беременности.

В экспериментальных исследованиях установлено, что при применении в высоких дозах клотrimазол оказывает эмбриотоксическое действие.

Неизвестно, выделяется ли клотrimазол с грудным молоком. Хотя клотrimазол не противопоказан к применению при беременности и в период лактации, следует учитывать потенциальный риск при выборе противогрибковой терапии.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

При одновременном применении с амфотерицином В, нистатином активность клотrimазола снижается.

Особые указания и меры предосторожности:

Лекарственные формы, предназначенные для интравагинального применения, не используются во время менструации.

Для предотвращения реинфекции необходимо одновременное лечение половых партнеров. Клотrimазол не рекомендуется применять в офтальмологии.

Источник: http://drugs.thead.ru/Kandid_tabletki