

## КАПСИКАМ



### Код АТХ:

- [M02AX10](#)

### Полезные ссылки:

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#) [Апрель](#)  
[Госреестр](#) [Википедия](#)  
[РЛС VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)<sup>англ</sup>

### Форма выпуска:

<b>Мазь для наружного применения</b>	<b>1 г</b>
бензилникотинат	20 мг
нонивамид (ваниллиллинамид)	2 мг
камфора рацемическая	30 мг
скипидар живичный	30 мг
диметилсульфоксид	50 мг

*Вспомогательные вещества:* бронопол, полисорбат 80, натрия цетилстеарилсульфат, спирт цетилстеариловый, эмульгатор тип А, вода очищенная.

30 г - тубы алюминиевые (1) - пачки картонные.

50 г - тубы алюминиевые (1) - пачки картонные.

### Фармакотерапевтическая группа:

- [Нейротропные средства](#)

### Фармакологические свойства:

#### **Фармакодинамика**

Комбинированный препарат для наружного применения. Оказывает местнораздражающее, анальгезирующее и противовоспалительное действие.

**Фармакокинетика**

Данные по фармакокинетике препарата Капсикам не предоставлены.

**Показания к применению:**

- миалгии;
- артралгии;
- в качестве разогревающей мази у спортсменов.

**Относится к болезням:**

- [Артралгия](#)
- [Арритрит](#)
- [Артроз](#)
- [Миалгия](#)

**Противопоказания:**

- кожные заболевания;
- беременность;
- лактация (грудное вскармливание);
- детский возраст;
- повышенная чувствительность к компонентам препарата.

**Способ применения и дозы:**

Применяют наружно.

При *миалгиях* и *артралгиях* - 1-3 г мази наносят на область болезненного участка и слегка втирают в кожу 2-3 раза/сут. Длительность курса лечения зависит от характера и тяжести заболевания и составляет в среднем 10 дней.

При применении *в качестве разогревающего средства у спортсменов* перед физической нагрузкой на соответствующие мышцы наносят небольшое количество мази (примерно 2-3 г) и втирают массирующими движениями до легкого покраснения кожи. После тренировки следует смыть мазь с кожи прохладной водой.

После каждой процедуры следует вымыть руки водой с мылом.

**Побочное действие:**

*Аллергические реакции:* возможны зуд, отек или крапивница.

**Передозировка:**

Данные о передозировке препарата Капсикам не предоставлены.

**Применение при беременности и кормлении грудью:**

Препарат противопоказан к применению при беременности и в период лактации.

**Взаимодействие с другими лекарственными средствами:**

## **КАПСИКАМ**

Фармакологическая база данных (<http://drugs.thead.ru>)

---

Данные о лекарственном взаимодействии препарата Капсикам не предоставлены.

### **Особые указания и меры предосторожности:**

Следует избегать попадания мази на открытые раны и слизистые оболочки. Во избежание побочных явлений рекомендуется предварительно нанести небольшое количество мази на кожу для определения чувствительности к препарату.

#### ***Применение в детском возрасте***

Препарат противопоказан в детском возрасте.

### **Условия хранения:**

Препарат следует хранить в недоступном для детей, прохладном месте при температуре от 8° до 15°C.

### **Срок годности:**

2 года.

### **Условия отпуска в аптеке:**

Без рецепта.

**Источник:** <http://drugs.thead.ru/Kapsikam>