Карбоцистеин

Код АТХ:

- R05CB03

Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- Карбоцистеин

Полезные ссылки:

Цена в Яндексе Горздрав Столички Апрель
Госреестр[МНН] Википедия[МНН]
РЛС VIDAL Mail.Ru Drugs.com[англ]

Форма выпуска:

Форма выпуска, описание и состав

◊ ***Сироп*** в виде прозрачной светло-желтой с коричневатым оттенком жидкости, с запахом карамели.

	1 мл
карбоцистеин	50 мг

Вспомогательные вещества: сахароза - 400 мг, ароматизатор "Карамель-крем 761" - 2 мг, метилпарагидроксибензоат (метилпарабен) - 1.5 мг, натрия гидроксид - до pH 6.1-6.3, вода очищенная - до 1 мл.

150 мл - флаконы (1) - пачки картонные.
200 мл - флаконы (1) - пачки картонные.
250 мл - флаконы (1) - пачки картонные.

Фармакотерапевтическая группа:

- Органотропные средства

Фармакологические свойства:

Фармакологическое действие — муколитическое, отхаркивающее.

Изменяет биохимические и физические свойства слизи, увеличивает синтез сиаломуцинов, снижает слизеобразование..

Фармакодинамика

Регулирует состояние слизи во всех структурах, содержащих мукопротеины (дыхательный, ЖКТ, мочеполовой тракт, внутреннее ухо); сиаломуцины легко связываются с водой, уменьшая вязкость слизи и облегчая отхаркивание мокроты.

Показания к применению:

Заболевания органов дыхания, сопровождающиеся выделением большого количества вязкой слизи: острый и хронический бронхит, трахеобронхит, бронхит с бронхообструктивным синдромом, бронхиальная астма, коклюш, бронхоэктатическая болезнь; воспалительные заболевания среднего уха и синусов; подготовка пациента к бронхоскопии и/или бронхографии.

Относится к болезням:

- Астма
- Бронхиальная астма
- Бронхит
- Бронхоэктатическая болезнь
- Коклюш
- Синусит
- Трахеит
- Трахеобронхит

Противопоказания:

Язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки в фазе обострения, хронический гломерулонефрит в фазе обострения, I триместр беременности, повышенная чувствительность к карбоцистеину.

Способ применения и дозы:

Взрослым при приеме внутрь в начале лечения - по 750 мг 3 раза/сут; после достижения клинического эффекта - 1.5 г/сут в 3-4 приема.

Детям в возрасте от 1 мес до 2.5 лет - по 50 мг 2 раза/сут; в возрасте от 2.5 до 5 лет - по 100 мг 2 раза/сут; старше 5 лет - по 200-250 мг 3 раза/сут.

Побочное действие:

Со стороны пищеварительной системы: редко - тошнота, рвота, боль в эпигастрии, диарея, кровотечение из ЖКТ.

Аллергические реакции: редко - кожная сыпь, ангионевротический отек.

Применение при беременности и кормлении грудью:

Противопоказан к применению в I триместре беременности. С осторожностью применяют во II и III триместрах беременности и в период лактации (грудного вскармливания).

Особые указания и меры предосторожности:

Диагнозы

- Астматический статус
- Бронхит
- Кашель
- Муковисцидоз

Источник: http://drugs.thead.ru/Karbocistein