Карипазим



Код АТХ:

- D03B

Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- Папайи млечный сок

Полезные ссылки:

Цена в Яндексе Горздрав Столички Апрель
Госреестр[МНН] Википедия[МНН] Реестр ЕАЭС
РЛС VIDAL Mail.Ru Drugs.com[англ]

Форма выпуска:

Лиофилизат для приготовления раствора для наружного применения	**1 фл.**
папаин (протеазы плодов папайи)	350 ПЕ

флаконы (1) - пачки картонные.
флаконы (10) - коробки картонные.

Лиофилизат для приготовления раствора для наружного применения	**1 фл.**
папаин (протеазы плодов папайи)	700 ПЕ

флаконы (1) - пачки картонные.
флаконы (10) - коробки картонные.

Фармакотерапевтическая группа:

- Метаболики

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Протеолитическое средство для наружного применения. Расщепляет некротизированные ткани, разжижает вязкие секреты, экссуадат. Близок по действию к трипсину и химотрипсину.

Фармакокинетика

При наружном применении препарат не всасывается и не оказывает системного влияния на организм.

Показания к применению:

— ожоги III-а степени (для ускорения отторжения струпов и для очищения гранулирующих ран от гнойно-некротических масс).

Противопоказания:

— беременность и период лактации;

— повышенная чувствительность к препарату.

Способ применения и дозы:

Наружно, в виде растворов 35 ПЕ/мл или 70 ПЕ/мл, в зависимости от толщины струпа. Содержимое флакона разводят в 10 мл 0.5% растворе новокаина или 0.9% растворе натрия хлорида. Раствор готовят непосредственно перед употреблением. Салфетку, смоченную препаратом, накладывают на ожоговую поверхность, закрывают влагонепроницаемой повязкой, которую меняют 1 раз/сут или через день, удаляя отслоившиеся некротизированные ткани. Одновременно обрабатывают не более 30% общей поверхности тела. Курс лечения от 4 до 12 дней.

Побочное действие:

Аллергические реакции.

Передозировка:

Случаев передозировки не описано.

Применение при беременности и кормлении грудью:

Противопоказан во время беременности и в период лактации.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Клинически значимых взаимодействий с другими лекарственными средствами не установлено.

Условия хранения:

В сухом защищенном от света месте при температуре не выше 15°С. Хранить в недоступном для детей месте. Срок годности - 1 год 6 мес.

Условия отпуска в аптеке:

По рецепту.

Источник: http://drugs.thead.ru/Karipazim