

[Карипазим](#)



Код АТХ:

- [D03B](#)

Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- [Папайи млечный сок](#)

Полезные ссылки:

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#)
[Госреестр](#)^{МНН} [Википедия](#)^{МНН}
[PLC VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)^{англ}

Форма выпуска:

Лиофилизат для приготовления раствора для наружного применения	1 фл.
папаин (протеазы плодов папайи)	350 ПЕ
флаконы (1) - пачки картонные. флаконы (10) - коробки картонные.	
Лиофилизат для приготовления раствора для наружного применения	1 фл.
папаин (протеазы плодов папайи)	700 ПЕ
флаконы (1) - пачки картонные. флаконы (10) - коробки картонные.	

Фармакотерапевтическая группа:

- [Метаболики](#)

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Протеолитическое средство для наружного применения. Расщепляет некротизированные ткани, разжижает вязкие секреты, экссудат. Близок по действию к трипсину и химотрипсину.

Фармакокинетика

При наружном применении препарат не всасывается и не оказывает системного влияния на организм.

Показания к применению:

— ожоги III-а степени (для ускорения отторжения струпов и для очищения гранулирующих ран от гнойно-некротических масс).

Противопоказания:

- беременность и период лактации;
- повышенная чувствительность к препарату.

Способ применения и дозы:

Наружно, в виде растворов 35 ПЕ/мл или 70 ПЕ/мл, в зависимости от толщины струпа. Содержимое флакона разводят в 10 мл 0.5% растворе новокаина или 0.9% растворе натрия хлорида. Раствор готовят непосредственно перед употреблением. Салфетку, смоченную препаратом, накладывают на ожоговую поверхность, закрывают влагонепроницаемой повязкой, которую меняют 1 раз/сут или через день, удаляя отслоившиеся некротизированные ткани. Одновременно обрабатывают не более 30% общей поверхности тела. Курс лечения от 4 до 12 дней.

Побочное действие:

Аллергические реакции.

Передозировка:

Случаев передозировки не описано.

Применение при беременности и кормлении грудью:

Противопоказан во время беременности и в период лактации.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Клинически значимых взаимодействий с другими лекарственными средствами не установлено.

Условия хранения:

В сухом защищенном от света месте при температуре не выше 15°C. Хранить в недоступном для детей месте. Срок годности - 1 год 6 мес.

Условия отпуска в аптеке:

По рецепту.

Источник: <http://drugs.thead.ru/Karipazim>