

Кармолис



Полезные ссылки:

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#) [Апрель](#)
[Госреестр](#) [Википедия](#)
[РЛС VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)^{англ}

Форма выпуска:

Гель для местного и наружного применения прозрачный, слегка опалесцирующий, с сильным, специфическим для эфирных масел, ментола и метилсалицилата запахом.

	1 г
левоментол	16.8 мг
метилсалицилат	10.7 мг
камфора	5.6 мг
масло сосны обыкновенной	10.1 мг
масло листьев эвкалипта	5.6 мг
масло терпентинное очищенное	4.5 мг
масло розмарина	2.3 мг
масло лаванды	2.3 мг
масло травы тимьяна обыкновенного	1.1 мг
масло мяты индийской (цитронеллы)	0.9 мг
масло шалфея	0.8 мг
масло мускатное	0.6 мг
масло анисовое	0.4 мг
масло гвоздичное	0.4 мг

Вспомогательные вещества: этанол 96% 550 мг, вода 347.4 мг, глицерол 20 мг, карбопол 980 10 мг, трометамол 6.5 мг, смола гидроксипропиловая (Ягуар HP120) 2 мг, пемулен TR-1 (акрилат/C10-30 алкил акрилат кроссполимер).

72 г - тубы алюминиевые (1) - пачки картонные.

145 г - тубы алюминиевые (1) - пачки картонные.

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Препарат оказывает местнораздражающее, местнообезболивающее (отвлекающее), противовоспалительное

действие.

Показания к применению:

- травмы опорно-двигательного аппарата и мягких тканей (растяжения связок и сухожилий, ушибы);
- в составе комплексной терапии воспалительных заболеваний суставов и мягких тканей.

Относится к болезням:

- [Травмы](#)
- [Ушиб](#)
- [Ушибы](#)

Противопоказания:

- повышенная чувствительность к компонентам препарата;
- нарушения функции почек;
- период беременности, грудного вскармливания,
- детский возраст (до 12 лет);
- аллергические заболевания в анамнезе;
- открытые и кровоточащие раны, заболевания кожи, раздражение кожи в месте предполагаемого нанесения препарата.

С осторожностью: бронхиальная астма.

Способ применения и дозы:

Наносить препарат на болезненную область до 5 раз в день с последующим массажем этой области. Курс лечения до 2-3 недель.

Побочное действие:

Возможны аллергические реакции, раздражение кожи (краснота, зуд).

Передозировка:

До настоящего времени случаи передозировки не наблюдались.

Применение при беременности и кормлении грудью:

Противопоказан при беременности и в период грудного вскармливания.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Не описано.

Особые указания и меры предосторожности:

Препарат предназначен только для наружного применения. Недопустимо попадание препарата в глаза, на слизистые

оболочки. Не использовать препарат для компрессов, повязок.

Не следует наносить препарат на большие поверхности кожи в течение длительного времени.

Если анальгезирующий эффект при применении препарата не наступает в течение нескольких дней, необходимо обратиться к врачу.

Следует тщательно мыть руки после применения препарата.

Влияние на способность к вождению автотранспорта и управлению механизмами

Учитывая, что лекарственный препарат содержит от 47,0 до 57,0 % (объемных) этилового спирта - в период лечения необходимо соблюдать осторожность при выполнении потенциально опасных видов деятельности, требующих повышенного внимания и быстроты психомоторных реакций (управление транспортными средствами, работы с движущимися механизмами, работа диспетчера и оператора и т.п.).

При нарушениях функции почек

Противопоказан при нарушениях функции почек

Применение в детском возрасте

Противопоказан детям до 12 лет

Условия хранения:

Хранить при температуре не выше 25°C. Хранить в местах, недоступных для детей.

Срок годности:

3 года.

Условия отпуска в аптеке:

Без рецепта.

Источник: <http://drugs.thead.ru/Karmolis>