

[Карниланд](#)



Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- [Валерианы лекарственной корневищ с корнями настойка](#)
- [Ландыша травы настойка](#)
- [Нитроглицерин](#)
- [Левоментола раствор в ментил изовалерате](#)

Полезные ссылки:

[Цена в Яндексе](#) [Горздрав](#) [Столички](#)
[Госреестр](#)^{МНН МНН МНН МНН} [Википедия](#)^{МНН МНН МНН МНН}
[РЛС VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)^{англ}

Форма выпуска:

Капли подъязычные.

	100 мл
настойка травы ландыша	21.7 мл
настойка ландыша	21.7 мл
левоментола раствор в ментил изовалерате	4.35 мл
нитроглицерин (1% раствор)	2.17 мл

25 мл - флакон-капельницы темного стекла (1) - пачки картонные.
50 мл - флакон-капельницы темного стекла (1) - пачки картонные.

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Седативное и спазмолитическое (сосудорасширяющее), улучшающее кровоснабжение и метаболизм миокарда. Состав по действию аналогичен прописи известной как капли Вотчала.

Показания к применению:

- купирование приступов стенокардии;
- кардиалгия.

Относится к болезням:

- [Кардиалгия](#)
- [Кардит](#)

Противопоказания:

- повышенная чувствительность к нитратам;
- шок;
- коллапс;
- одновременный прием силденафила;
- возраст до 18 лет (эффективность и безопасность не установлены).

С осторожностью: черепно-мозговая гипертензия, тампонада сердца, изолированный митральный стеноз, констриктивный перикардит (состояния, сопровождающиеся снижением давления заполнения левого желудочка), неконтролируемая гиповолемия, у больных с сердечной недостаточностью при нормальном или низком давлении в легочной артерии, геморрагический инсульт, субарахноидальное кровоизлияние, недавно перенесенная травма головы, токсический отек легких, идиопатический гипертрофический субаортальный стеноз, закрытоугольная форма глаукомы с высоким внутриглазным давлением, тяжелая анемия, гипертиреоз, нарушение мозгового кровообращения, шок, артериальная гипотензия (систолическое АД меньше 90 мм рт. ст.), беременность, период грудного вскармливания.

Способ применения и дозы:

Сублингвально. По 10-15 капель 3-4 раза/сут с небольшим количеством жидкости или наносят на кусок сахара и держат во рту (под языком), не проглатывая до полного всасывания. С учетом индивидуальной чувствительности и переносимости разовая доза может составлять от 5 до 25 капель.

Побочное действие:

Со стороны сердечно-сосудистой системы: головокружение, ортостатическая гипотензия, "нитратная" головная боль, тахикардия, гиперемия кожи, жар.

Со стороны ЖКТ: сухость во рту, тошнота. При наличии побочных эффектов рекомендуется уменьшить дозу препарата для однократного приема.

Передозировка:

Симптомы: выраженное снижение артериального давления с ортостатической дисрегуляцией, рефлекторная тахикардия, головная боль; может развиваться астенция; головокружение, повышенная сонливость, чувство жара, тошнота, рвота.

При подозрении на передозировку необходимо немедленно обратиться за врачебной помощью. До прихода врача пострадавшего следует уложить, приподняв ноги.

Применение при беременности и кормлении грудью:

Во время беременности и грудного вскармливания прием препарата возможен только по жизненным показаниям.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Одновременное применение с вазодилататорами, гипотензивными средствами, ингибиторами АПФ, бета-адреноблокаторами, блокаторами медленных кальциевых каналов, прокаинамидом, трициклическими антидепрессантами, ингибиторами MAO, ингибиторами фосфодиэстеразы, а также этанолом, усиливает гипотензивный эффект.

Особые указания и меры предосторожности:

На фоне приема препарата возможно значительное снижение артериального давления и появление головокружения при резком переходе в вертикальное положение из положения "лежа" или "сидя"; при употреблении алкоголя, выполнении физических упражнений и жаркой погоде.

Карниланд

Фармакологическая база данных (<http://drugs.thead.ru>)

К препарату Карниланд, как и ко всем органическим нитратам, при частом применении развивается привыкание, при этом требуется повышение дозировки.

Условия хранения:

При температуре от 12°C до 15°C, в защищенном от света, недоступном для детей месте. Срок годности – 2 года. Не использовать позже даты, указанной на упаковке.

Условия отпуска в аптеке:

Без рецепта.

Источник: <http://drugs.thead.ru/Karniland>