

## Кашнол



### Код АТХ:

- [R05CA](#)

### Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- [Бромгексин](#)
- [Гвайфенезин](#)
- [Рацементол](#)
- [Сальбутамол](#)

### Полезные ссылки:

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#) [Апрель](#)  
[Госреестр](#) [Википедия](#)  
[РЛС VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)

### Форма выпуска:

**Сироп** в виде жидкости красного цвета с запахом малины и сладким вкусом.

|                                |             |
|--------------------------------|-------------|
|                                | <b>5 мл</b> |
| сальбутамол (в форме сульфата) | 1 мг        |
| бромгексина гидрохлорид        | 2 мг        |
| гвайфенезин                    | 50 мг       |
| ментол                         | 500 мкг     |

**Вспомогательные вещества:** сахароза, лимонной кислоты моногидрат, натрия эдетат, натрия бензоат, калия сорбат, пропиленгликоль, глицерол, сорбитола раствор 70%, ментол, ароматизатор малиновый, вода очищенная, краситель пунцовый 4R.

100 мл - флаконы темного стекла (1) в комплекте с мерным стаканом - пачки картонные.

### Фармакологические свойства:

#### Фармакодинамика

Комбинированный препарат, состоящий из ингредиентов, применяемых для симптоматического лечения кашля при различных легочных заболеваниях. Обладает бронхолитическим, муколитическим и отхаркивающим действием.

*Сальбутамол* оказывает бронхолитическое действие путем селективного действия на бета<sub>2</sub>-адренергические рецепторы бронхов.

*Бромгексин* разжижает мокроту, увеличивает ее объем. Муколитическое действие обусловлено способностью деполимеризовать и разжижать мукопротеины и мукополисахаридные волокна.

*Гвайфенезин* обладает отхаркивающим действием. Уменьшает адгезивность, поверхностное натяжение мокроты, что улучшает ее отхождение.

*Ментол* обладает слабым антисептическими свойствами оказывает успокаивающее действие и уменьшает раздражение слизистой оболочки дыхательных путей.

## Показания к применению:

Острые и хронические бронхо-легочные заболевания, сопровождающиеся затруднением отхождения мокроты:

- бронхиальная астма;
- трахеобронхит;
- обструктивный бронхит;
- пневмония;
- эмфизема легких;
- пневмокониоз и др.

## Относится к болезням:

- [Астма](#)
- [Бронхит](#)
- [Пневмокониоз](#)
- [Пневмония](#)
- [Трахеит](#)
- [Трахеобронхит](#)
- [Эмфизема легких](#)

## Противопоказания:

- повышенная чувствительность к компонентам препарата;
- беременность;
- период лактации;
- детский возраст до 3-х лет;
- тахикардия;
- миокардит;
- пороки сердца;
- декомпенсированный сахарный диабет;
- тиреотоксикоз;
- глаукома;
- печеночная или почечная недостаточность;
- язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки в стадии обострения.

С *осторожностью* применять у пациентов с сахарным диабетом, артериальной гипертензией, язвенной болезнью желудка, и двенадцатиперстной кишки в стадии ремиссии.

## Способ применения и дозы:

Препарат Кашнол назначают **взрослым и детям старше 12 лет** по 10 мл (2 чайные ложки) 3 раза/сут.

**Детям от 6 до 12 лет** - 5-10 мл (1-2 чайные ложки) 3 раза/сут; **детям от 3 до 6 лет** - по 5 мл (1 чайная ложка) 3 раза/сут.

Между применением очередных доз препарата необходим перерыв не менее 6 ч.

## Побочное действие:

*Иногда:* головная боль, головокружение, повышенная нервная возбудимость, нарушение сна, сонливость, тремор, судороги, тошнота, рвота, диарея, обострение язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, учащенное сердцебиение; *возможно* окрашивание мочи в розовый цвет, аллергические реакции (сыпь, крапивница), снижение АД, коллапс.

## Передозировка:

О случаях передозировки не сообщалось. Возможно усиление вышеуказанных побочных эффектов.

*Лечение* симптоматическое.

## Применение при беременности и кормлении грудью:

Препарат противопоказан к применению при беременности.

При необходимости лечения Кашнолом в период лактации грудное вскармливание следует прекратить.

## Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Другие бета<sub>2</sub>-адреномиметические средства и теофиллин усиливают действие сальбутамола и увеличивают вероятность появления побочных эффектов.

Кашнол не назначают одновременно с препаратами, содержащими кодеин и другими противокашлевыми средствами, т.к. это затрудняет отхождение разжиженной мокроты.

Входящий в состав препарата Кашнол бромгексин способствует проникновению антибиотиков (эритромицин, цефалексин, окситетрациклин) в легочную ткань.

Не рекомендуется применять препарат Кашнол одновременно с неселективными блокаторами бета-адренорецепторов, такими как пропранолол.

Входящий в состав препарата Кашнол сальбутамол не рекомендуется пациентам, которые получают ингибиторы МАО.

Диуретики и ГКС усиливают гипокалиемический эффект сальбутамола.

Не рекомендуется принимать одновременно с Кашнолом щелочное питье.

## Особые указания и меры предосторожности:

### **При нарушениях функции почек**

Противопоказание: почечная недостаточность

### **При нарушениях функции печени**

Противопоказание: печеночная недостаточность

**Применение в детском возрасте**

Противопоказание: детский возраст до 3 лет.

**Условия хранения:**

Препарат следует хранить при температуре не выше 25°C в защищенном от света и в недоступном для детей месте. Не использовать после истечения срока годности.

**Срок годности:**

3 года.

**Условия отпуска в аптеке:**

По рецепту.

**Источник:** <http://drugs.thead.ru/Kashnol>